



Prélèvement du 15 septembre 2021 - PM + 2h : 15h22

				Quantités de larves pour 1,5 m³			
15/09/2021	Lieu de prélèvement	Température -1m (°C)	Salinité -1m (‰)	Petites	Petites évoluées	Moyennes	Grosses
Seudre	Coux	22,1	33,7	60 ↘	2 400 ↘	0 ⇨	0 ⇨
Centre du Bassin	Mérignac	20,2	33,8	1 740 ↘	240 ↗	0 ⇨	0 ⇨
Charente	La Moulière	21,1	30,2	270 ↘	0 ⇨	0 ⇨	0 ⇨
	Fouras	21,4	31,2	0 ↘	210 ↗	0 ⇨	30 ↗
Moyenne		21,2	32,2	518	713	0	8

* Salinité de référence de l'eau de mer, Océan Atlantique = 35‰.

Les flèches ↗↘↔ représentent l'évolution depuis le dernier bulletin.


Appréciation des quantités de larves

Faible

10

Forte

Évolution de la température et de la salinité de l'eau



Évolution de la température de l'eau (°C) et de la salinité (mg/l, ou ‰) sur l'ensemble des 4 sites de prélèvements de larves d'huîtres, comparées aux références : moyenne de 2005 à 2020 (source : suivi des larves, Creaa / CAPENA).

La salinité est relativement stable, restant en dessous de la normale de saison ($-2,4\text{‰}$).

La température de l'eau est supérieure à la normale de saison (+2,4 °C).

Commentaires : Les stades larvaires

- ⇒ **Seudre : Coux**
 - Faible quantité de larves au stade *Petites*
 - Quantité importante de larves au stade *Petites évoluées*
- ⇒ **Milieu de bassin : Mérignac**
 - Faibles quantités de larves aux stades *Petites* et *Petites évoluées*
- ⇒ **Charente :**
 - Faible quantité de larves au stade *Petites* sur La Moulière
 - Faibles quantités de larves aux stades *Petites évoluées* et *Grosses* sur Fouras

Dernier prélèvement de la saison.

Reprise du suivi des larves de moules fin février 2022 et celui des larves d'huitres mi-juin 2022. Une synthèse sera publiée prochainement.

Données sur www.creaa.fr (Suivi) et Répondeur CAPENA : 05 46 47 71 21