



Prélèvements du 22 juin 2022
PM = 13h19

| Lieu de prélèvement | Température de l'eau -1m (°C) | Salinité -1m (‰)* | Quantité de larves / 1,5m ³ | | |
|---------------------|-------------------------------|-------------------|--|-------------------------|------------------|
| | | | Stades | | |
| | | | Petites (<0,11mm) | Moyennes (0,11 à 0,2mm) | Grosses (>0,2mm) |
| Arguin | 20.6 | 34.1 | 150 ↗ | 270 → | 30 ↘ |
| Ferret | 21.1 | 34.1 | 90 ↘ | 315 ↗ | 0 → |
| Courbey | 20.8 | 34.2 | 650 ↗ | 400 ↗ | 0 ↘ |
| Piquey | 23.5 | 33.5 | 250 ↗ | 80 ↗ | 30 ↗ |
| Humeyre | 23.8 | 33.4 | 120 ↗ | 0 ↘ | 0 → |
| Moyenne | 22.0 | 33.9 | 252 | 213 | 12 |



* Salinité de référence de l'eau de mer, Océan Atlantique = 35‰.

Les flèches ↗ ↘ ↔ représentent l'évolution depuis le dernier bulletin.

Appréciation des quantités de larves en comparaison avec les références par stades larvaires : Abaque basé sur les résultats de l'ensemble des points obtenus depuis 2016 (Arguin et Courbey) et 2018 (Ferret, Piquey, Humeyre) ; Source CAPENA.

Appréciation des quantités de larves

Faible Modérée Forte



* Moyennes des températures et salinités de l'eau sur le Bassin d'Arcachon – données Ifremer réseau ARCHYD

La **température de l'eau** est supérieure (+1,9°C) à la moyenne de référence 2006-2021.

La **salinité** est supérieure (+1,2‰) à la moyenne de référence 2006-2021.

Présence de larves de moules au stade *petites* en faibles quantités sur l'ensemble des points.

Quantités modérées de larves de moules au stade *moyennes* au Ferret et Courbey, quantités faibles sur Arguin et Piquey et absence de larves à la Humeyre.

Présence de larves au stade *grosses* en quantités faibles à Arguin et Piquey. Absence de larves sur les autres points.

Prochains prélèvements de larves de moules le 1^{er} juillet 2022.

Marion Béchade – m.bechade@cape-na.fr
CAPENA – Expertise et Application
05 57 73 08 45 – https://www.cape-na.fr/



RÉGION Nouvelle-Aquitaine

