

Date	Lieu de prélèvement	Température - 1m (°C)	Salinité * -1m (‰)	Quantités de larves pour 1,5 m ³					
				Petites (<0,11 mm)	Nb moyen** 2005-2021	Moyennes (0,11 à 0,2 mm)	Nb moyen** 2005-2021	Grosses (> 0,2 mm)	Nb moyen** 2005-2021
22/02/2022	Boyard	10,1	31,1	14 550	874	60	49	90	17
	Trompe-Sot	10,2	31,9	3 450	416	0	38	0	8

* Salinité de référence de l'eau de mer, Océan Atlantique = 35‰.

** Suivi des larves : Moyenne des quantités de larves observées
Pour la même période considérée sur le site de Boyard (2005-2021)
et le site de Trompe-Sot (2011 à 2021) pour 1,5m³


Les flèches ↗↘↔ représentent l'évolution depuis le dernier bulletin.

Appréciation des quantités de larves

Faible
Moyenne
Forte

Appréciation sur **l'ensemble de la saison** (février à juillet), basée sur les résultats sur Boyard depuis 2006.

Évolution de la température et de la salinité de l'eau



Évolution de la température de l'eau (°C) et de la salinité (g/l, ou ‰) sur le site de Boyard et Trompe-Sot, comparées aux références : moyennes de 2005 à 2021.

La salinité est supérieure à la normale de saison (+4,9‰).

La température de l'eau est proche de la normale de saison.

Commentaires



⇒ Boyard :

- Forte quantité de larves au stade Petites
- Faibles quantités de larves aux stades Moyennes et Grosses.


⇒ Trompe - Sot :

- Quantité modérée de larves au stade Petites

Évolution des quantités de larves



Quantités de larves aux stades « Petites », « Moyennes » et « Grosses », observées en 2022 et moyennes de référence (« Petites » et « Grosses ») observées pour la même période sur le site de Boyard (2006-2021) et le site de Trompe-Sot (2011 à 2021), pour 1,5m³.



Prélèvement du 8 mars 2022 - PM + 2h : 9H31

Date	Lieu de prélèvement	Température -1m (°C)	Salinité * -1m (‰)	Quantités de larves pour 1,5 m ³					
				Petites (<0,11 mm)	Nb moyen**	Moyennes (0,11 à 0,2 mm)	Nb moyen**	Grosses (> 0,2 mm)	Nb moyen**
08/03/2022	Boyard	9,8	32,3	2 850 ↘	712	300 ↗	107	210 ↗	23
	Trompe-Sot	9,7	31,5	600 ↘	197	420 ↗	8	270 ↗	56

* Salinité de référence de l'eau de mer, Océan Atlantique = 35‰.

** Suivi des larves : Moyenne des quantités de larves observées

Pour la même période considérée sur le site de Boyard (2005-2021) et le site de Trompe-Sot (2011 à 2021) pour 1,5m³


Les flèches ↗↘↔ représentent l'évolution depuis le dernier bulletin.

Appréciation des quantités de larves

 Faible
 Moyenne
 Forte

Appréciation sur l'ensemble de la saison (février à juillet), basée sur les résultats sur Boyard depuis 2006.

Évolution de la température et de la salinité de l'eau



Évolution de la température de l'eau (°C) et de la salinité (g/l, ou ‰) sur le site de Boyard et Trompe-Sot, comparées aux références : moyennes de 2005 à 2021.



La salinité est supérieure à la normale de saison (+0,9‰).

La température de l'eau est proche de la normale de saison.

Commentaires

- ⇒ **Boyard :**
 - Faibles quantités de larves aux 3 stades
- ⇒ **Trompe - Sot :**
 - Faibles quantités de larves aux 3 stades

Évolution des quantités de larves

Quantités de larves aux stades « Petites », « Moyennes » et « Grosses », observées en 2022 et moyennes de référence (« Petites » et « Grosses ») observées pour la même période sur le site de Boyard (2006-2021) et le site de Trompe-Sot (2011 à 2021), pour 1,5m³.
 Bouquet Anne Lise – al.bouquet@cape-na.fr
 CAPENA – Expertise et Application
 05 46 47 49 52 – www.creaa.fr



Prélèvement du 21 mars 2022 - PM + 2h : 8h17

Date	Lieu de prélèvement	Température -1m (°C)	Salinité * -1m (‰)	Quantités de larves pour 1,5 m ³					
				Petites (<0,11 mm)	Nb moyen**	Moyennes (0,11 à 0,2 mm)	Nb moyen**	Grosses (> 0,2 mm)	Nb moyen**
21/03/2022	Boyard	11,1	32,1	1 170 ↗	1392	180 ↗	42	120 ↗	125
	Trompe-Sot	11,1	31,1	1 150 ↗	595	100 ↗	52	150 ↗	52

* Salinité de référence de l'eau de mer, Océan Atlantique = 35‰.

** Suivi des larves : Moyenne des quantités de larves observées


Pour la même période considérée sur le site de Boyard (2005-2021) et le site de Trompe-Sot (2011 à 2021), pour 1,5m³

Les flèches ↗↘↔ représentent l'évolution depuis le dernier bulletin.

Appréciation des quantités de larves

Faible
Moyenne
Forte
Appréciation sur **l'ensemble de la saison** (février à juillet), basée sur les résultats sur Boyard depuis 2006.

Évolution de la température et de la salinité de l'eau



Évolution de la température de l'eau (°C) et de la salinité (g/l, ou ‰) sur le site de Boyard et Trompe-Sot, comparées aux références : moyennes de 2005 à 2021.



La salinité est stable, supérieure à la normale de saison (+1,2‰ en moyenne).

La température de l'eau est supérieure à la normale de saison (+1°C).

Commentaires


- ⇒ **Boyard :**
- Faibles quantités de larves aux 3 stades
- ⇒ **Trompe - Sot :**
- Faibles quantités de larves aux 3 stades

Évolution des quantités de larves

Quantités de larves aux stades « Petites », « Moyennes » et « Grosses », observées en 2022 et moyennes de référence (« Petites » et « Grosses ») observées pour la même période sur le site de Boyard (2005-2021) et le site de Trompe-Sot (2011 à 2021), pour 1,5m³.
 Bouquet Anne Lise – al.bouquet@cape-na.fr
 CAPENA – Expertise et Application
 05 46 47 49 52 – www.creaa.fr

Prochain prélèvement : Mardi 5 avril.

Données sur www.creaa.fr (Suivi)



Prélèvement du 04 avril 2022 - PM + 2h : 9h00

Date	Lieu de prélèvement	Température -1m (°C)	Salinité * -1m (‰)	Quantités de larves pour 1,5 m ³					
				Petites (<0,11 mm)	Nb moyen**	Moyennes (0,11 à 0,2 mm)	Nb moyen**	Grosses (> 0,2 mm)	Nb moyen**
04/04/2022	Boyard	10,1	31,8	3 990 ↗	3157	150 ↘	161	30 ↘	593
	Trompe-Sot	10,5	32,6	2 400 ↗	513	300 ↗	238	180 ↗	48

* Salinité de référence de l'eau de mer, Océan Atlantique = 35‰.

** Suivi des larves : Moyenne des quantités de larves observées

Pour la même période considérée sur le site de Boyard (2005-2021) et le site de Trompe-Sot (2011 à 2021), pour 1,5m³


Les flèches ↗↘↔ représentent l'évolution depuis le dernier bulletin.

Appréciation des quantités de larves

 Faible
 Moyenne
 Forte

Appréciation sur l'ensemble de la saison (février à juillet), basée sur les résultats sur Boyard depuis 2006.

Évolution de la température et de la salinité de l'eau



Évolution de la température de l'eau (°C) et de la salinité (g/l, ou ‰) sur le site de Boyard et Trompe-Sot, comparées aux références : moyennes de 2005 à 2021.

La salinité est stable, supérieure à la normale de saison (+1‰ en moyenne).

La température de l'eau est descendue en dessous de la normale de saison (-0,5°C).

Commentaires



⇒ Boyard :

- Quantité modérée de larves au stade Petites ;
- Faibles quantités aux stades Moyennes et Grosses ;

⇒ Trompe - Sot :


- Quantité modérée de larves au stade Petites ;
- Faibles quantités aux stades Moyennes et Grosses ;

Évolution des quantités de larves

Quantités de larves aux stades « Petites », « Moyennes » et « Grosses », observées en 2022 et moyennes de référence (« Petites » et « Grosses ») observées pour la même période sur le site de Boyard (2005-2021) et le site de Trompe-Sot (2011 à 2021), pour 1,5m³.
 Bouquet Anne Lise – al.bouquet@cape-na.fr
 CAPENA – Expertise et Application
 05 46 47 49 52 – www.creaa.fr

Prochain prélèvement : Jeudi 21 avril.

Données sur www.creaa.fr (Suivi)



Prélèvement du 21 avril 2022 - PM + 2h : 10h21

Date	Lieu de prélèvement	Température -1m (°C)	Salinité * -1m (‰)	Quantités de larves pour 1,5 m ³					
				Petites (<0,11 mm)	Nb moyen**	Moyennes (0,11 à 0,2 mm)	Nb moyen**	Grosses (> 0,2 mm)	Nb moyen**
21/04/2022	Boyard	13,3	32,5	3 570 ↘	3304	850 ↗	447	170 ↗	304
	Trompe-Sot	13,1	31,1	930 ↘	3168	240 ↘	2318	120 ↘	113

* Salinité de référence de l'eau de mer, Océan Atlantique = 35‰.


** Suivi des larves : Moyenne des quantités de larves observéesPour la même période considérée sur le site de Boyard (2005-2021) et le site de Trompe-Sot (2011 à 2021), pour 1,5m³

Les flèches ↗↘↔ représentent l'évolution depuis le dernier bulletin.

Appréciation des quantités de larves

 Faible
 Moyenne
 Forte
Appréciation sur **l'ensemble de la saison** (février à juillet), basée sur les résultats sur Boyard depuis 2006.

Évolution de la température et de la salinité de l'eau



Évolution de la température de l'eau (°C) et de la salinité (g/l, ou ‰) sur le site de Boyard et Trompe-Sot, comparées aux références : moyennes de 2005 à 2021.

La salinité est stable, proche de la normale de saison.

La température de l'eau est en hausse, proche de la normale de saison.

Commentaires



⇒ Boyard :

- Quantité modérée de larves au stade *Petites* ;
- Faibles quantités aux stades *Moyennes* et *Grosses* ;

⇒ Trompe – Sot :

- Faibles quantités aux 3 stades : *Petites*, *Moyennes* et *Grosses* ;


Évolution des quantités de larves

Quantités de larves aux stades « Petites », « Moyennes » et « Grosses », observées en 2022 et moyennes de référence (« Petites » et « Grosses ») observées pour la même période sur le site de Boyard (2005-2021) et le site de Trompe-Sot (2011 à 2021), pour 1,5m³.

Bouquet Anne Lise – al.bouquet@cape-na.fr
CAPENA – Expertise et Application
05 46 47 49 52 – www.creaa.fr

Prochain prélèvement : Jeudi 5 mai.

Données sur www.creaa.fr (Suivi)



Prélèvement du 5 mai 2022 - PM + 2h : 9h41

Date	Lieu de prélèvement	Température -1m (°C)	Salinité * -1m (‰)	Quantités de larves pour 1,5 m ³					
				Petites (<0,11 mm)	Nb moyen**	Moyennes (0,11 à 0,2 mm)	Nb moyen**	Grosses (> 0,2 mm)	Nb moyen**
05/05/2022	Boyard	14,8	32,9	20 640 ↗	11 189	720 ↘	2 785	360 ↗	1 056
	Trompe-Sot	15,2	32,5	4 980 ↗	7 125	480 ↗	3 180	300 ↗	645

* Salinité de référence de l'eau de mer, Océan Atlantique = 35‰.


** Suivi des larves : Moyenne des quantités de larves observéesPour la même période considérée sur le site de Boyard (2005-2021) et le site de Trompe-Sot (2011 à 2021), pour 1,5m³

Les flèches ↗↘↔ représentent l'évolution depuis le dernier bulletin.

Appréciation des quantités de larves

 Faible
 Moyenne
 Forte
Appréciation sur **l'ensemble de la saison** (février à juillet), basée sur les résultats sur Boyard depuis 2006.

Évolution de la température et de la salinité de l'eau



Évolution de la température de l'eau (°C) et de la salinité (g/l, ou ‰) sur le site de Boyard et Trompe-Sot, comparées aux références : moyennes de 2005 à 2021.

La salinité est stable, proche de la normale de saison.

La température de l'eau est en hausse, au-dessus de la normale de saison (en moyenne : +1,2°C).

Commentaires



⇒ Boyard :

- Quantité très importante de larves au stade *Petites* ;
- Faible quantité au stade *Moyennes*
- Quantité modérée de larves au stade *Grosses* ;

⇒ Trompe - Sot :


- Quantité imodérée de larves au stade *Petites* ;
- Faible quantité au stade *Moyennes*
- Quantité modérée de larves au stade *Grosses*

Évolution des quantités de larves

Quantités de larves aux stades « Petites », « Moyennes » et « Grosses », observées en 2022 et moyennes de référence (« Petites » et « Grosses ») observées pour la même période sur le site de Boyard (2005-2021) et le site de Trompe-Sot (2011 à 2021), pour 1,5m³.
 Bouquet Anne Lise – al.bouquet@cape-na.fr
 CAPENA – Expertise et Application
 05 46 47 49 52 – www.creaa.fr

Prochain prélèvement : mardi 10 mai.

Données sur www.creaa.fr (Suivi)



Prélèvement du 11 mai 2022 - PM + 2h : 16h28

Date	Lieu de prélèvement	Température -1m (°C)	Salinité * -1m (‰)	Quantités de larves pour 1,5 m ³					
				Petites (<0,11 mm)	Nb moyen**	Moyennes (0,11 à 0,2 mm)	Nb moyen**	Grosses (> 0,2 mm)	Nb moyen**
11/05/2022	Boyard	17,9	33,1	218 790 ↗	26815	6 750 ↗	13123	210 ↗	3195
	Trompe-Sot	19,6	32,2	40 470 ↗	2168	990 ↗	1293	90 ↘	283

* Salinité de référence de l'eau de mer, Océan Atlantique = 35‰.

** Suivi des larves : Moyenne des quantités de larves observées

Pour la même période considérée sur le site de Boyard (2005-2021) et le site de Trompe-Sot (2011 à 2021), pour 1,5m³


Les flèches ↗↘↔ représentent l'évolution depuis le dernier bulletin.

Appréciation des quantités de larves

 Faible
 Moyenne
 Forte

Appréciation sur l'ensemble de la saison (février à juillet), basée sur les résultats sur Boyard depuis 2006.

Évolution de la température et de la salinité de l'eau



Évolution de la température de l'eau (°C) et de la salinité (g/l, ou ‰) sur le site de Boyard et Trompe-Sot, comparées aux références : moyennes de 2005 à 2021.

La salinité est stable, proche de la normale de saison.

La température de l'eau est en hausse, au-dessus de la normale de saison (en moyenne : +3,8°C).

Commentaires



⇒ Boyard :

- Quantité très importante de larves au stade Petites ;
- Quantité importante de larves au stade Moyennes
- Quantité faible de larves au stade Grosses ;

⇒ Trompe - Sot :

- Quantité importante de larves au stade Petites ;
- Faibles quantités de larves aux stades Moyennes et Grosses.

Évolution des quantités de larves

Quantités de larves aux stades « Petites », « Moyennes » et « Grosses », observées en 2022 et moyennes de référence (« Petites » et « Grosses ») observées pour la même période sur le site de Boyard (2005-2021) et le site de Trompe-Sot (2011 à 2021), pour 1,5m³.
 Bouquet Anne Lise – al.bouquet@cape-na.fr
 CAPENA – Expertise et Application
 05 46 47 49 52 – www.creaa.fr

Prochain prélèvement : jeudi 19 mai.

Données sur www.creaa.fr (Suivi)



Prélèvement du 18 mai 2022 - PM + 2h : 08h49

Date	Lieu de prélèvement	Température -1m (°C)	Salinité * -1m (‰)	Quantités de larves pour 1,5 m ³					
				Petites (<0,11 mm)	Nb moyen**	Moyennes (0,11 à 0,2 mm)	Nb moyen**	Grosses (> 0,2 mm)	Nb moyen**
18/05/2022	Boyard	16,7	33,9	31 440 ↗	7780	2 810 ↗	7805	595 ↗	4127
	Trompe-Sot	17,9	33,4	7 980 ↗	6200	1 435 ↗	1912	315 ↗	721

* Salinité de référence de l'eau de mer, Océan Atlantique = 35‰.

** Suivi des larves : Moyenne des quantités de larves observées

Pour la même période considérée sur le site de Boyard (2005-2021) et le site de Trompe-Sot (2011 à 2021), pour 1,5m³


Les flèches ↗↘↔ représentent l'évolution depuis le dernier bulletin.

Appréciation des quantités de larves

 Faible
 Moyenne
 Forte

Appréciation sur l'ensemble de la saison (février à juillet), basée sur les résultats sur Boyard depuis 2006.

Évolution de la température et de la salinité de l'eau



Évolution de la température de l'eau (°C) et de la salinité (g/l, ou ‰) sur le site de Boyard et Trompe-Sot, comparées aux références : moyennes de 2005 à 2021.

La salinité est légèrement supérieure à la normale de saison (32,4 ‰ à cette période). La température de l'eau est au-dessus de la normale de saison (en moyenne : +2,1°C).

Commentaires



⇒ Boyard :

- Quantité importante de larves au stade Petites ;
- Quantité modérée de larves au stade Moyennes
- Quantité modérée de larves au stade Grosses ;

⇒ Trompe – Sot :

- Quantité importante de larves au stade Petites ;
- Quantité modérée de larves au stade Moyennes
- Quantité modérée de larves au stade Grosses ;

Évolution des quantités de larves

Quantités de larves aux stades « Petites », « Moyennes » et « Grosses », observées en 2022 et moyennes de référence (« Petites » et « Grosses ») observées pour la même période sur le site de Boyard (2005-2021) et le site de Trompe-Sot (2011 à 2021), pour 1,5 m³.
 Bouquet Anne Lise – al.bouquet@cape-na.fr
 CAPENA – Expertise et Application
 05 46 47 49 52 - www.creaa.fr

Prochain prélèvement : Mardi 24 mai.

Données sur www.creaa.fr (Suivi)



Prélèvement du 24 mai 2022 - PM + 2h : 16h05

Date	Lieu de prélèvement	Température -1m (°C)	Salinité * -1m (‰)	Quantités de larves pour 1,5 m ³					
				Petites (<0,11 mm)	Nb moyen**	Moyennes (0,11 à 0,2 mm)	Nb moyen**	Grosses (> 0,2 mm)	Nb moyen**
24/05/2022	Boyard	18,0	33,6	9 345 ↗	5566	4 445 ↗	4407	700 ↗	1566
	Trompe-Sot	19,0	33,6	2 350 ↗	4383	2 000 ↗	1426	400 ↗	648

* Salinité de référence de l'eau de mer, Océan Atlantique = 35‰.

** Suivi des larves : Moyenne des quantités de larves observées

Pour la même période considérée sur le site de Boyard (2005-2021) et le site de Trompe-Sot (2011 à 2021), pour 1,5m³


Les flèches ↗↘↔ représentent l'évolution depuis le dernier bulletin.

Appréciation des quantités de larves

 Faible
  Moyenne
  Forte

Appréciation sur l'ensemble de la saison (février à juillet), basée sur les résultats sur Boyard depuis 2006.

Évolution de la température et de la salinité de l'eau



Évolution de la température de l'eau (°C) et de la salinité (g/l, ou ‰) sur le site de Boyard et Trompe-Sot, comparées aux références : moyennes de 2005 à 2021.

La salinité est stable, toujours supérieure à la normale de saison (+1‰, avec une normale à 32,5‰ à cette période). La température de l'eau est au-dessus de la normale de saison (en moyenne : +2,6°C).

Commentaires



⇒ Boyard :

- Quantités importantes de larves aux stades Petites et Moyennes ;
- Quantité modérée de larves au stade Grosses ;

⇒ Trompe - Sot :

- Quantités modérées de larves aux 3 stades : Petites, Moyennes et Grosses.


Évolution des quantités de larves



Quantités de larves aux stades « Petites », « Moyennes » et « Grosses », observées en 2022 et moyennes de référence (« Petites » et « Grosses ») observées pour la même période sur le site de Boyard (2005-2021) et le site de Trompe-Sot (2011 à 2021), pour 1,5 m³.

Bouquet Anne Lise – al.bouquet@cape-na.fr
 CAPENA – Expertise et Application
 05 46 47 49 52 – www.creaa.fr

Prochain prélèvement : Mercredi 1^{er} juin.Données sur www.creaa.fr (Suivi)

Prélèvement du 1^{er} juin 2022 - PM + 2h : 8h23

Date	Lieu de prélèvement	Température -1m (°C)	Salinité * -1m (‰)	Quantités de larves pour 1,5 m ³					
				Petites (<0,11 mm)	Nb moyen**	Moyennes (0,11 à 0,2 mm)	Nb moyen**	Grosses (> 0,2 mm)	Nb moyen**
01/06/2022	Boyard	16,6	34,0	4 410 ↘	5559	1 470 ↘	2924	690 ↘	1939
	Trompe-Sot	17,4	33,3	8 700 ↗	2068	2 050 ↗	1225	520 ↗	753

Appréciation des quantités de larves

Faible
Moyenne
Forte

Appréciation sur l'ensemble de la saison (février à juillet), basée sur les résultats sur Boyard depuis 2006.


* Salinité de référence de l'eau de mer, Océan Atlantique = 35‰.

** Suivi des larves : Moyenne des quantités de larves observées

Pour la même période considérée sur le site de Boyard (2005-2021)et le site de Trompe-Sot (2011 à 2021). pour 1.5m³

Les flèches ↗↘↔ représentent l'évolution depuis le dernier bulletin.

Évolution de la température et de la salinité de l'eau



Évolution de la température de l'eau (°C) et de la salinité (g/l, ou ‰) sur le site de Boyard et Trompe-Sot, comparées aux références : moyennes de 2005 à 2021.

La salinité est stable, toujours supérieure à la normale de saison (+1,1‰).

La température de l'eau a baissé, avec une valeur moyenne proche de la normale de saison.

Commentaires



⇒ Boyard :

- Quantités modérées de larves aux 3 stades : Petites, Moyennes et Grosses ;

⇒ Trompe – Sot :

- Quantité importante de Petites larves
- Quantités modérées de larves aux stades Moyennes et Grosses.

Évolution des quantités de larves



Quantités de larves aux stades « Petites », « Moyennes » et « Grosses », observées en 2022 et moyennes de référence (« Petites » et « Grosses ») observées pour la même période sur le site de Boyard (2005-2021) et le site de Trompe-Sot (2011 à 2021), pour 1,5 m³.