



Prélèvements du 30 juin 2022
BM = 13h02 / PM = 19h22

	Lieu de prélèvement	Heure du prélèvement	Température de l'eau -1m (°C)	Salinité -1m (‰)*	Quantité de larves / 1,5m ³			
					Stades			
					Petites	Petites évoluées	Moyennes	Grosses
Secteur Est	Arams	14h55	21.6	32.1	90 ↘	135 ↘	35 ↗	0 ⇨
	Gujan	15h40	21.7	31.4	0 ↘	0 ↘	0 ⇨	0 ⇨
	Comprian	15h55	21.6	31.7	40 ↘	40 ↘	40 ↗	0 ⇨
Secteur Ouest	Courbey	16h20	20.7	34.0	210 ↘	210 ↘	0 ⇨	0 ⇨
	Piquey	16h40	21.7	33.5	120 ↘	30 ↘	120 ↗	0 ⇨
	Arès	17h15	21.9	33.4	210 ↘	420 ↘	120 ↗	0 ⇨



* Salinité de référence de l'eau de mer, Océan Atlantique = 35‰.

Les flèches ↘ ⇨ ↗ représentent l'évolution depuis le dernier bulletin.

Appréciation des quantités de larves en comparaison avec les références par stades larvaires : Abaque basé sur les résultats obtenus depuis 1993 ; Sources Ifremer et CAPENA.

Appréciation des quantités de larves

 Faible
 Modérée
 Forte



* Moyennes des températures et salinités de l'eau sur le Bassin d'Arcachon – données Ifremer réseau ARCHYD

La **température de l'eau** est équivalente (+0,1°C) à la moyenne de référence 2000-2021.

La **salinité** est largement supérieure (+2,4‰) à la moyenne de référence 2006-2021.

Secteur Est : Absence de larves aux stades *petites* et *moyennes* à Gujan, quantités faibles sur les autres points. Quantités modérées au stade *petites évoluées* à Arams, faible à Comprian et absence à Gujan. Absence de larves au stade *grosses*.

Secteur Ouest : Quantités faibles de larves au stade *petites* sur l'ensemble des points. Quantités modérées au stade *petites évoluées* au Courbey et à Arès, quantité faible à Piquey. Absence de larves au stade *moyennes* au Courbey, quantités faibles à Piquey et Arès. Absence de larves au stade *grosses*.

Prochains prélèvements de larves d'huîtres le 04 juillet 2022.

Marion Béchade – m.bechade@cape-na.fr
CAPENA – Expertise et Application
05 57 73 08 45 – https://www.cape-na.fr/



RÉGION Nouvelle-Aquitaine

