

Prélèvements du 14 septembre 2022
BM = 14h54 / PM = 21h01





	Lieu de prélèvement	Heure du prélèvement	Température de l'eau -1m (°C)	Salinité -1m (‰)*	Quantité de larves / 1,5m ³			
					Stades			
					Petites	Petites évoluées	Moyennes	Grosses
Secteur Est	Arams	17h15	23.3	33.7	240 ↘	0 ⇒	0 ⇒	0 ⇒
	Gujan	17h30	23.5	33.5	40 ↘	0 ⇒	0 ⇒	35 ↘
	Comprian	17h40	23.2	33.4	100 ↘	0 ↘	0 ⇒	0 ⇒
Secteur Ouest	Courbey	18h20	Problème technique		180 ↘	0 ⇒	0 ⇒	0 ↘
	Piquey	18h35			360 ↘	60 ↗	0 ⇒	0 ↘
	Arès	18h50			360 ↘	0 ⇒	0 ⇒	0 ↘

* Salinité de référence de l'eau de mer, Océan Atlantique = 35‰.

Les flèches ↘ ⇒ ↗ représentent l'évolution depuis le dernier bulletin.

Appréciation des quantités de larves en comparaison avec les références par stades larvaires : Abaque basé sur les résultats obtenus depuis 1993 ; Sources Ifremer et CAPENA.

Appréciation des quantités de larves



* Moyennes des températures et salinités de l'eau sur le Bassin d'Arcachon – données Ifremer réseau ARCHYD

La **température de l'eau** est supérieure (+1,9°C) à la moyenne de référence 2000-2021.

La **salinité** est légèrement inférieure (-0,1‰) à la moyenne de référence 2006-2021.

Secteur Est : Quantités faibles de larves aux stades *petites* sur l'ensemble des points. Absence de larves aux stades *petites évoluées* et *moyennes* sur l'ensemble des points. Quantité faible au stade *grosses* à Gujan, absence de larves sur les autres points.

Secteur Ouest : Quantités faibles de larves au stade *petites* sur l'ensemble des points. Quantité faible au stade *petites évoluées* à Piquey, absence de larves sur les autres points. Absence de larves aux stades *moyennes* et *grosses* sur l'ensemble des points.

Derniers prélèvements de larves d'huîtres de la saison 2022.

Marion Béchade – m.bechade@cape-na.fr
CAPENA – Expertise et Application
05 57 73 08 45 – https://www.cape-na.fr/