



Date	Lieu de prélèvement	Température -1m (°C)	Salinité * -1m (‰)	Quantités de larves pour 1,5 m ³					
				Petites (<0,11 mm)	Nb moyen**	Moyennes (0,11 à 0,2 mm)	Nb moyen**	Grosses (> 0,2 mm)	Nb moyen**
27/03/2023	Boyard	11,6	24,8	4 920 ↘	1367	6 840 ↗	57	420 ↗	124
	Trompe-Sot	11,5	31,5	420 ↗	674	350 ↗	59	0 ↘	66


* Salinité de référence de l'eau de mer, Océan Atlantique = 35‰.

** Suivi des larves : Moyenne des quantités de larves observées

Pour la même période considérée sur le site de Boyard (2005-2022) et le site de Trompe-Sot (2011 à 2022), pour 1,5m³


Les flèches ↗↘↔ représentent l'évolution depuis le dernier bulletin.

Appréciation des quantités de larves



Appréciation sur l'ensemble de la saison (février à juillet), basée sur les résultats sur Boyard depuis 2006.

Évolution de la température et de la salinité de l'eau



Évolution de la température de l'eau (°C) et de la salinité (g/l, ou ‰) sur le site de Boyard et Trompe-Sot, comparées aux références : moyennes de 2005 à 2022.



La salinité a fortement descendu sur Boyard, avec 24,8‰, soit -5,7‰ en dessous de la moyenne de référence, alors qu'elle est toujours au-dessus de la moyenne de référence sur Trompe-sot (+1‰).

La température de l'eau est au-dessus de la normale de saison (+1,3°C).

Commentaires

- ⇒ **Boyard :**
 - Quantités modérées de larves aux stades Petites et Grosses.
 - Forte quantité de larves au stade Moyenne.
- ⇒ **Trompe – Sot :**
 - Faibles quantités de larves aux 3 stades Petites, Moyennes et Grosses.

Évolution des quantités de larves



Quantités de larves aux stades « Petites », « Moyennes » et « Grosses », observées en 2023 et moyennes de référence (« Petites » et « Grosses ») observées pour la même période sur le site de Boyard (2005-2022) et le site de Trompe-Sot (2011 à 2022), pour 1,5 m³.