



Prélèvements du 24 mai 2023
PM = 09h09





Lieu de prélèvement	Température de l'eau -1m (°C)	Salinité -1m (‰)*	Quantité de larves / 1,5m ³		
			Stades		
			Petites (<0,11mm)	Moyennes (0,11 à 0,2mm)	Grosses (>0,2mm)
Arguin	15,3	35,3	3 520 ↘	2 845 ↘	360 ↘
Ferret	15,5	35,1	2 080 ↗	600 ↘	120 ↗
Courbey	15,8	35,0	920 ↘	800 ↘	360 ↘
Piquey	17,8	33,4	2 800 ↗	2 170 ↗	0 ↘
Humeyre	17,9	33,3	245 ↗	1 635 ↗	60 ↗
Moyenne	16,5	34,4	1 913	1 610	180

Appréciation des quantités de larves en comparaison avec les références par stades larvaires : Abaque basé sur les résultats de l'ensemble des points obtenus depuis 2016 (Arguin et Courbey) et 2018 (Ferret, Piquey, Humeyre) ; Source CAPENA.

Appréciation des quantités de larves

 Faible
 Modérée
 Forte



* Moyennes des températures et salinités de l'eau sur le Bassin d’Arcachon – données Ifremer réseau ARCHYD

La **température de l'eau** est inférieure (-0,5°C) à la moyenne de référence 2006-2022.

La **salinité** est largement supérieure (+2,1‰) à la moyenne de référence 2006-2022.

Présence en quantités modérées de larves de moules au stade *petites* à Arguin, au Ferret et au Courbey, et en quantités faibles sur les autres points.

Quantités élevées de larves de moules au stade *moyennes* à Arguin, à Piquey et à la Humeyre, et quantités modérées sur les autres points.

Présence de larves de moules au stade *grosses* en quantités élevées à Arguin et au Courbey, en quantités modérées au Ferret et à la Humeyre, et absence de larves à Piquey.

Prochains prélèvements de larves de moules le 30 mai 2023.

Marion Béchade – m.bechade@cape-na.fr
CAPENA – Expertise et Application

05 57 73 08 45 / 06 81 98 30 72 – <https://www.cape-na.fr/>



RÉGION Nouvelle-Aquitaine

