



Prélèvements du 07 juillet 2023
PM = 09h21





Lieu de prélèvement	Température de l'eau -1m (°C)	Salinité -1m (‰)	Quantité de larves / 1,5m ³		
			Stades		
			Petites (<0,11mm)	Moyennes (0,11 à 0,2mm)	Grosses (>0,2mm)
Arguin	20,8	34,4	30 ⇨	150 ↗	0 ⇨
Ferret	20,8	34,3	0 ↘	90 ↘	0 ↘
Courbey	20,6	34,5	40 ↘	80 ↘	0 ⇨
Piquey	22,7	33,0	30 ↘	30 ↘	30 ↗
Humeyre	22,7	33,2	0 ↘	80 ↘	0 ⇨
Moyenne	21,5	33,9	20	86	6

Appréciation des quantités de larves en comparaison avec les références par stades larvaires : Abaque basé sur les résultats de l'ensemble des points obtenus depuis 2016 (Arguin et Courbey) et 2018 (Ferret, Piquey, Humeyre) ; Source CAPENA.

Appréciation des quantités de larves

 Faible
 Modérée
 Forte



* Moyennes des températures et salinités de l'eau sur le Bassin d'Arcachon – données Ifremer réseau ARCHYD

La **température de l'eau** est supérieure (+0,8°C) à la moyenne de référence 2006-2022.

La **salinité** est supérieure (+0,9‰) à la moyenne de référence 2006-2022.

Présence en quantités faibles de larves de moules aux stades *petites* à Arguin, au Courbey et à Piquey. Absence de larves sur les autres points.

Quantités faibles de larves de moules au stade *moyennes* sur l'ensemble des points.

Présence de larves de moules au stade *grosses* en quantité faible à Piquey, et absence de larves sur les autres points.

Derniers prélèvements de larves de moules de la saison 2023.

Marion Béchade – m.bechade@cape-na.fr
CAPENA – Expertise et Application

05 57 73 08 45 / 06 81 98 30 72 – <https://www.cape-na.fr/>

