

Bulletin d'information sur le Bassin d'Arcachon

État des mortalités d'huîtres creuses à la date du 27 septembre 2023

Le Flash Info Mortalités « FIM » présente aux ostréiculteurs une actualité sur les mortalités 2023. Les faits et connaissances communiqués sont validés par l'ensemble des partenaires : CAPENA, CRCAA, Ifremer et DDTM.

Les résultats ci-dessous présentent les constats des mortalités d'huître creuse à l'issue de l'été 2023. Les données sont collectées via les divers réseaux d'observations de CAPENA et de ses partenaires :

- **Observatoire ostréicole du Bassin d'Arcachon** mis en place par CAPENA : naissains naturels arcachonnais sur 6 parcs de référence (FIM n°0). Dernier échantillonnage au 27/09/2023. Les résultats sont disponibles sur le bulletin saisonnier : [ICI](#).
- **Suivi Interrégional des Performances des Naissains (SIPEN-33)** mis en place par CAPENA : 2 lots de naissains naturels (arcachonnais et charentais), 3 lots 3N et 3 lots 2N mutualisés entre les 4 centres techniques régionaux français. Suivis sur 3 parcs de référence de CAPENA. Dernier échantillonnage au 15/09/2023.
- **Suivi ECOSCOPA de l'Ifremer** : naissains NSI (Naissains Standardisés Ifremer, diploïdes) sur le parc du Tès. Dernier échantillonnage au 15/09/2023.

Mortalités dans le Bassin d'Arcachon

| Mortalité cumulée moyenne en % | OBS - 33 | SIPEN - 33 | | | | ECOSCOPA |
|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | Lots naturels arcachonnais | Lots naturels arcachonnais | Lots naturels charentais | Lots d'écloserie 2N | Lots d'écloserie 3N | Naissains NSI |
| An 1 (naissains) | 61,2 | 66,9 | 52,7 | 51,3 | 29,3 | 53,0 |
| An 2 (18 mois) | 22,6 | 12,0 | 21,7 | 14,7 | 27,7 | 4,8 |
| An 3 (30 mois) | 13,7 | 11,2 | 10,3 | 9,2 | 18,6 | 4,7 |

Rq : Mortalité Observatoire est de 60,1% (An1), 22,2% (An2) et 12,8% (An3) sur les parcs en commun pour l'OBS et SIPEN

Les pertes sur les huîtres de 2^{ème} année évoluent entre 12% et 28% avec les plus faibles valeurs pour le naissain de captage naturel du Bassin d'Arcachon.

Les huîtres triploïdes sont les plus touchées par la mortalité en 2^{ème} et 3^{ème} année d'élevage, avec respectivement 28% et 19%.

Mortalités dans les autres bassins de production

Observatoire national ECOSCOPA

Moyenne des mortalités cumulées par bassin de production sur les huîtres à la fin de l'été 2023.

Observatoire ostréicole et SIPEN en Charente Maritime - CAPENA

| Mortalité cumulée moyenne en % | OBS - 17 | SIPEN - 17 | | | |
|--------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
| | Lots naturels charentais | Lots naturels arcachonnais | Lots naturels charentais | Lots d'écloserie 2N | Lots d'écloserie 3N |
| An 1 (naissains) | 24,6 | 63,4 | 47,4 | 41,5 | 26,2 |
| An 2 (18 mois) | 18,2 | 21,2 | 17,7 | 29,8 | 38,3 |
| An 3 (30 mois) | 14,5 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,0 |

Rq : Mortalité An1 Observatoire de 27,9% sur les 2 parcs en commun pour l'OBS et SIPEN


Le mot du CRC et de la DDTM

Un dispositif au titre des calamités agricoles (sur les mortalités observées en automne 2022) a été validé en juillet dernier. La phase de dépôt des dossiers est terminée depuis le 1^{er} octobre. La phase d'instruction débute à présent. Sous réserve d'avis favorable, les professionnels devraient être indemnisés au plus tard le 1^{er} trimestre 2024.

Depuis mi-septembre, certains professionnels observent des mortalités de naissains (huîtres/moules) sur les poches ou sur les pignots. Quelques-uns rapportent des mortalités sur les huîtres marchandes. Un prélèvement d'huîtres marchandes moribondes a été effectué le 22/09 et envoyé à Ifremer pour caractérisation des pathogènes. Le CRCAA vous communiquera les résultats dès réception.

N'hésitez pas à contacter le CRCAA si vous constatez des mortalités anormales. Pour rappel, les hausses de mortalités exceptionnelles se déclarent désormais en ligne sur le site www.repamo.fr.

Les mortalités cumulées sur le naissain à l'issue de l'été sont comprises entre 29% sur les lots d'huîtres triploïdes et 67% sur le naissain naturel arcachonnais.



Marion Béchade – m.bechade@cape-na.fr

CAPENA – Expertise et Application

05 57 73 08 45 / 06 81 98 30 72 – <http://www.creaa.fr/>