





Prélèvements du 24 février 2025
PM = 15h08

| Lieu de prélèvement | Température de l'eau -1m (°C) | Salinité -1m (‰) | Quantité de larves / 1,5m ³ | | |
|---------------------|-------------------------------|------------------|--|-------------------------|------------------|
| | | | Stades | | |
| | | | Petites (<0,11mm) | Moyennes (0,11 à 0,2mm) | Grosses (>0,2mm) |
| Arguin | 12,8 | 32,4 | 660 ↘ | 300 ↗ | 30 ↗ |
| Ferret | 13,0 | 31,1 | 750 ↘ | 120 ↘ | 80 ↗ |
| Courbey | 12,8 | 30,9 | 580 ↘ | 70 ↗ | 30 ↗ |
| Piquey | 12,7 | 27,4 | 510 ↗ | 90 ↗ | 0 ↘ |
| Humeyre | 12,9 | 27,1 | 90 ↘ | 0 ↘ | 0 ↗ |
| Moyenne | 12,8 | 29,8 | 518 | 116 | 28 |

Appréciation des quantités de larves en comparaison avec les références par stades larvaires : Abaque basé sur les résultats de l'ensemble des points obtenus depuis 2016 (Arguin et Courbey) et 2018 (Ferret, Piquey, Humeyre) ; Source CAPENA.

Appréciation des quantités de larves

 Faible
 Modérée
 Forte



Références des températures et salinités de l'eau sur le Bassin d’Arcachon – données Ifremer réseau ARCHYD

La **température de l'eau** est largement supérieure (+2.44°C) à la moyenne de référence 2006-2024.

La **salinité** est inférieure (-0.7‰) à la moyenne de référence 2006-2024.

Présence de larves de moules au stade *petites* en quantités faibles tous les points.

Quantités faibles de larves de moules au stade *moyennes* à Arguin, au Ferret, au Courbey et à Piquey, absence à la Humeyre.

Quantités faibles de larves de moules au stade *grosses* à Arguin, au Ferret et au Courbey, absence sur les autres points.

Prochains prélèvements de larves de moules le 5 mars 2025.

Léa MARMION – l.marmion@cape-na.fr
CAPENA – Expertise et Application

05 57 73 08 45 / 06 81 98 30 72 – <https://www.cape-na.fr/>



RÉGION Nouvelle-Aquitaine

