

| Date       | Lieu de prélèvement | Température -1m (°C) | Salinité * -1m (‰) | Quantités de larves pour 1,5 m <sup>3</sup> |            |                          |            |                    |            |
|------------|---------------------|----------------------|--------------------|---|------------|--------------------------|------------|--------------------|------------|
|            |                     |                      |                    | Petites (<0,11 mm)                          | Nb moyen** | Moyennes (0,11 à 0,2 mm) | Nb moyen** | Grosses (> 0,2 mm) | Nb moyen** |
| 05/03/2025 | Boyard              | 10,5                 | 28,7               | 1 200 ↗                                     | 4245       | 240 ↗                    | 123        | 0 ↘                | 63         |
|            | Trompe-Sot          | 10,3                 | 28,5               | 150 ↘                                       | 236        | 250 ↗                    | 63         | 50 ↗               | 78         |


\* Salinité de référence de l'eau de mer, Océan Atlantique = 35‰.

\*\* Suivi des larves : Moyenne des quantités de larves observées

Pour la même période considérée sur le site de Boyard (2005-2024) et le site de Trompe-Sot (2011 à 2024), pour 1,5m<sup>3</sup>


Les flèches ↗↘↔ représentent l'évolution depuis le dernier bulletin.

Appréciation des quantités de larves



Appréciation sur l'ensemble de la saison (février à juillet), basée sur les résultats sur Boyard depuis 2006.

Évolution de la température et de la salinité de l'eau



Évolution de la température de l'eau (°C) et de la salinité (g/l, ou ‰) sur le site de Boyard et Trompe-Sot, comparées aux références : moyennes de 2005 à 2024.

La salinité moyenne est proche de la valeur moyenne de référence (-0,7‰).



La température moyenne de l'eau est supérieure à la moyenne de référence (+1,4°C).

La salinité et la température sont proches sur les deux sites suivis.

Commentaires

- ⇒ **Boyard :**
  - Faibles quantités de larves aux stades Petites et Moyennes.
- ⇒ **Trompe - Sot :**
  - Faibles quantités de larves aux 3 stades : Petites, Moyennes et Grosses.

Évolution des quantités de larves



Quantités de larves aux stades « Petites », « Moyennes » et « Grosses », observées en 2025 et moyennes de référence (« Petites » et « Grosses ») observées pour la même période sur le site de Boyard (2005-2024) et le site de Trompe-Sot (2011 à 2024), pour 1,5 m<sup>3</sup>.

Prochain prélèvement : 19 mars 2025.

Données sur

<https://www.cape-na.fr/documentation-specifique/>

(Rubrique Suivi Larves Huitres et Moules 17)