### Numération des larves de moules en Charente-Maritime





Bulletin d'information

Pour affichage


Prélèvement du 4 juin 2025 - PM + 2h: 14h51

				Quantités de larves pour 1,5 m <sup>3</sup>					
Date	Lieu de prélèvement	Température -1m (°C)	Salinité * -1m (‰)	Petites (<0,11 mm)	Nb moyen**	Moyennes (0,11 à 0,2 mm)	Nb moyen**	Grosses (> 0,2 mm)	Nb moyen**
04/06/2025	Boyard	17,9	31,8	11 736 💆	4470	5 580 🗷	1763	124 🗸	982
	Trompe-Sot	18,6	32,5	330 ₺	6067	150 ₪	1322	0 🕸	747

<sup>\*</sup>Salinité de référence de l'eau de mer, Océan Atlantique = 35%.

Les flèches ♂☆⇒ représentent l'évolution depuis le dernier bulletin.

## Évolution de la température et de la salinité de l'eau



Évolution de la température de l'eau (°C) et de la salinité (g/l, ou ‰) sur le site de Boyard et Trompe-Sot, comparées aux références : moyennes de 2005 à 2024.

La salinité moyenne est toujours en dessous de la valeur de référence (-1,3%), et la température moyenne de l'eau reste supérieure à la valeur de référence (+1,6°C).

Les températures, comme les salinités, sont proches sur les deux sites suivis.

## **Commentaires**

#### ⇒ Boyard:

- Fortes quantités de larves aux stades Petites et Moyennes.
- > Faible quantité de larves au stade grosses.

#### Trompe - Sot:


Faibles quantités de larves aux stades : Petites et Moyennes.


> Bouquet Anne Lise – al.bouquet@cape-na.fr CAPENA – Expertise et Application 05 46 47 49 52 - www.cape-na.fr

# Appréciation des quantités de larves Faible Moyenne Forte

Appréciation sur *l'ensemble de la saison* (février à juillet), basée sur les résultats sur Boyard depuis 2006.

# Évolution des quantités de larves





Quantités de larves aux stades « Petites », « Moyennes » et « Grosses », observées en 2025 et moyennes de référence (« Petites » et « Grosses ») observées pour la même période sur le site de Boyard (2005-2024) et le site de Trompe-Sot (2011 à 2024), pour 1,5 m³.

Prochain prélèvement : 12 juin 2025.

Données sur

https://www.cape-na.fr/documentation-specifique/

(Rubrique Suivi Larves Huitres et Moules 17)











<sup>\*\*</sup>Suivi des larves : <u>Moyenne des quantités</u> de larves observées <u>Pour la même période considérée</u> sur le site de Boyard (2005-2024) et le site de Trompe-Sot (2011 à 2024), pour 1,5m<sup>3</sup>