

Flash Info Mortalités

Bulletin d'information sur les Pertuis Charentais

État sur les mortalités d'huîtres et de moules à la date du 6 juin 2025

Le Flash Info Mortalités « FIM » présente aux conchyliculteurs une actualité sur les mortalités des mollusques. Les faits et connaissances communiqués sont validés par l'ensemble des partenaires : CAPENA, CRC-17, Ifremer et DDTM.

Les résultats ci-dessous présentent les constats des mortalités d'huître creuse et de la moule commune au cours du printemps 2025. Les données sont issues des réseaux d'observations de CAPENA et de ses partenaires :

- **Observatoire ostréicole du littoral charentais (OBS-17) de CAPENA** : Naissains naturels charentais sur 12 parcs de référence ([FIM n°0](#)). Dernier échantillonnage au 26/05/2025.
- **Suivi Interrégional des Performances des Naissains (SIPEN-17)** : 2 lots de naissains naturels (arcachonnais et charentais), 3 lots 3N et 3 lots 2N mutualisés entre les 4 centres techniques régionaux français. Suivis sur 2 parcs de référence de CAPENA ; Dernier échantillonnage au 26/05/2025.
- **Suivi ECOSCOPA de l'Ifremer** : Naissains NSI (Naissains Standardisés Ifremer, diploïdes) sur le parc de D'Agnas ; Dernier échantillonnage au 26/05/2025.
- **Mytilobs** : Observatoire des mortalités de moules d'Ifremer. Dernier échantillonnage au 13/05/2025.

Mortalités des huîtres :

⇒ En Charente-Maritime

Mortalité cumulée moyenne en %	OBS-17	SIPEN-17					ECOSCOPA
	Lots naturels charentais	Lots naturels arcachonnais	Lots naturels charentais	Lots d'écloserie 2N	Lots d'écloserie 3N	Naissains NSI	
An 1 (naissains)	40,3	48,2	38,1	38,6	30,9	58,6	
An 2 (18 mois)	Echantillonnages prévus en juin.						3,4
An 3 (30 mois)							4,3

Rq : Mortalité An1 Observatoire sur les 2 parcs en commun pour l'OBS et SIPEN : 55,7

⇒ Dans les autres bassins :

Observatoire ostréicole (OBS-33) et SIPEN du Bassin d'Arcachon – CAPENA (27/05/2025)

Mortalité cumulée moyenne en %	OBS-33	SIPEN-33					ECOSCOPA
	Lots naturels arcachonnais	Lots naturels arcachonnais	Lots naturels charentais	Lots d'écloserie 2N	Lots d'écloserie 3N	Naissains NSI au 12/05/25	
An 1 (naissains)	43,1	39,1	41,2	33,3	21,7	1,7	
An 2 (18 mois)	Echantillonnages prévus en juin.						
An 3 (30 mois)							

Rq : Mortalité An1 Observatoire-33 sur 3 parcs commun pour l'OBS et SIPEN : 42,7%.

Les mortalités de naissains d'huîtres sont apparues début mai, dans les pertuis charentais. Elles se sont confirmées durant le mois de mai sur les deux bassins ostréicoles de Nouvelle-Aquitaine (17 et 33).

Les naissains naturels présentent 38 à 48% de mortalité fin mai, suivis de près des naissains diploïdes (2N) avec 38,6% de mortalité en Charente-Maritime et 33,3% sur Arcachon, puis des triploïdes (3N) avec respectivement 30,9% et 21,7% de mortalité cumulée.


Le naissain NSI présente de 0,6% à 45,9% de mortalités sur l'ensemble des sites français au 26/05/2025.

	An1	Date Echl
B. des Veys	0,6	27/05/2025
Baie Mt St Michel	0,6	12/05/2025
Rade de Brest	45,9	27/05/2025
Penerf	5	26/05/2025
B. Bourgneuf	2,3	13/05/2025
Thau	65,8	13/05/2025

Mortalités de moules :

Mortalités de moules importantes constatées par les professionnels dans le Pertuis Breton, sur une courte période, au niveau des filières début avril, puis sur les bouchots 1 à 2 semaines plus tard. Quelques constats ont été réalisés sur les Saumonards.

Le suivi Mytilobs montre 15% de mortalité cumulée au 13 mai sur Boyard.



Le mot du CRC et de la DDTM

- ⇒ A ce jour, quelques déclarations REPAMO ont été réalisées sur les moules et les huîtres. Les résultats d'analyses réalisées sur les moules du Pertuis Breton montrent une absence de pathogènes réglementés.
- ⇒ Il est rappelé l'importance de **ramasser les bigorneaux perceurs** sur vos concessions pour limiter la prédation sur les mollusques : Voir la note d'information « Déprédation bigorneaux perceurs » dans le bulletin d'information du CRC17 : [24 MAREE D'INFO#24 CRC 19 MAI 2025](#).
- ⇒ **Rappel :**

En cas de constat de mortalité anormale, les déclarations officielles sont à réaliser via le site www.repamo.fr

Pour toutes informations complémentaires vous pouvez vous adresser à vos référents CRC régionaux (Félix ANSART 06.70.53.46.25 / Aliénor PRIVAT 06.83.19.65.22).

Bouquet Anne-Lise – al.bouquet@cape-na.fr
CAPENA – Expertise et Application
05 46 47 49 52 – www.cape-na.fr

Bilan 2024 sur les mortalités d'huîtres du littoral charentais

Observatoire ostréicole de CAPENA


Pour les huîtres d'origine naturelle, l'année 2024 est caractérisée par des mortalités de 1^{ère} année (55,6%) et de 2^{ème} année (15,9%), proches des moyennes de référence (moyennes 1994-2023 : An 1 : 55,8% ; An 2 : 16,0%).

Par contre les mortalités de 3^{ème} année étaient élevées, avec 20,2% (Référence : 16,6%).

La croissance en 2024 a été normale pour les huîtres de 1^{ère} et 2^{ème} année, et plus importante que la moyenne de référence pour les huîtres de 3^{ème} année.

Détails des résultats sur le bulletin saisonnier de fin d'automne 2024 de l'observatoire de CAPENA [ICI](#)

Série temporelle des mortalités cumulées (%) des 3 classes d'âges d'huîtres creuses en fonction des années. Données issues de l'Observatoire Ostréicole du littoral charentais ([Barbier et al. 2024](#)).




Suivi interrégional des performances de naissains

En 2024, en Charente-Maritime, les mortalités en 1^{ère} année d'élevage ont varié de 40 % (triploïdes) à 56 % (naturel d'Arcachon) et les poids individuels se situaient entre 13,1g (diploïde d'écloserie) et 16 g (naturel d'Arcachon).

En 2^{ème} année, la mortalité moyenne était de 39,2% (naturel arcachonnais : 33,5% ; 2N : 37,5% ; naturel charentais : 38,9% ; 3N : 47%). Et en 3^{ème} année, la mortalité moyenne était de 24% (2N : 19,1 ; naturel arcachonnais : 19,2% ; naturel charentais : 25,4% ; 3N : 32,8%).

En 2^{ème} et 3^{ème} année, la croissance des naissains naturels des 2 origines a été similaire avec +24,4g en An2 et +17,2 en An3. La croissance des triploïdes était de +48g en An2 et +56,3g en An3, et celle des diploïdes d'écloserie était +28,5g en An2 et +24,8g en An3.



Mortalités annuelles de 2024 (%) dans le Bassin de Marennes-Oléron pour les huîtres de (a) 1^{ère} année, (b) 2^{ème} année et (c) 3^{ème} année d'élevage, en fonction de l'origine du naissain ; Rouge : 3N écloserie ; Bleu : 2N écloserie ; Vert : Naturel charentais ; Jaune : Naturel arcachonnais. Données issues du suivi SIPEN ([Barbier et al. 2024](#)).

Au cours du cycle complet (3 ans d'élevage : 2022-2024), la perte par mortalité représente 80% pour les 3N, 67% pour les naissains naturels arcachonnais, 63% pour les 2N et naturels charentais.

Au vu des croissances obtenues sur les 3 années, **les rendements du cycle à 3 ans**, en kg/1000 naissains de départ, sont de 24,3kg pour les 2N, 23,3kg pour les 3N, 21,5kg pour les naissains naturels charentais et 17,8kg pour les naturels arcachonnais.

Détails des résultats 2024 du suivi interrégional des performances d'élevage de naissains d'huîtres creuses (SIPEN) en Charente-Maritime [ICI](#).