



Prélèvements du 1^{er} juillet 2025
BM = 16h25


	Lieu de prélèvement	Température de l'eau -1m (°C)	Salinité -1m (‰)	Quantité de larves / 1,5m ³			
				Stades			
				Petites	Petites évoluées	Moyennes	Grosses
Secteur Est	Arams	26,7	31,6	1 470 ↘	4050 ↗	0 ⇨	0 ⇨
	Gujan	28,6	30,8	2 140 ↗	5980 ↗	0 ⇨	0 ⇨
	Comprian	27,8	30,8	1 980 ↘	9 660 ↗	0 ⇨	0 ⇨
Secteur Ouest	Courbey	21,7	33,9	2 100 ↗	420 ↗	0 ⇨	0 ⇨
	Piquey	25,9	32,1	3 540 ↗	13430 ↗	0 ⇨	0 ⇨
	Arès	27,2	31,5	480 ↘	680 ↗	0 ⇨	0 ⇨
	Arguin	19,7	34,4	2 160 ↗	20 ↗	0 ⇨	0 ⇨
Moyenne		25,4	32,2	1 981	4 891	0	0

Appréciation des quantités de larves en comparaison avec les références par stades larvaires : Abaque basé sur les résultats obtenus depuis 1993 ; Sources Ifremer et CAPENA.


Appréciation des quantités de larves



Évolution de la température et de la salinité de l'eau à -1 m



Évolution des cohortes de larves d'huîtres en 2025



Références des températures et salinités de l'eau sur le Bassin d'Arcachon – données Ifremer réseau ARCHYD (2013-2024)

La **température de l'eau** est largement supérieure (+4,0°C) à la moyenne de référence 2000-2024.

La **salinité** est équivalente (+ 0,0 ‰) à la moyenne de référence 2006-2024.

Secteur Est : Quantités faibles de larves au stade *petites* sur tous les points. Quantités fortes de larves au stade *petites évoluées* sur tous les points. Pas d'observation de larve au stade *moyennes* et *grosses*.

Secteur Ouest : Quantité modérée de larves au stade *petites* à Piquey et quantités faibles sur les autres points. Quantité forte de larves au stade *petites évoluées* à Piquey, quantités modérées au Courbey et à Arès, et quantité faible à Arguin. Pas d'observation de larve au stade *moyennes* et *grosses*.

Prochains prélèvements : 3 juillet 2025

Léa Marmion – l.marmion@cape-na.fr
CAPENA – Expertise et Application

05 57 73 08 45 / 06 81 98 30 72 – <https://www.cape-na.fr/>