

## Bulletin d'information sur le Bassin d'Arcachon

### État des mortalités d'huîtres creuses à la date du 27 juin 2025

Le Flash Info Mortalités « FIM » présente aux ostréiculteurs une actualité sur les mortalités 2025. Les faits et connaissances communiqués sont validés par l'ensemble des partenaires : CAPENA, CReAA, Ifremer et DDTM.

Les résultats ci-dessous présentent les constats des mortalités d'huître creuse à l'issue du printemps 2025. Les données sont issues des divers réseaux d'observations de CAPENA et de ses partenaires :

- **Observatoire ostréicole du Bassin d'Arcachon** mis en place par CAPENA : naissains naturels arcachonnais sur 6 parcs de référence ([FIM n°0](#)). Dernier échantillonnage au 26/06/2024. Les résultats sont disponibles sur le bulletin saisonnier : [ICI](#).
- **Suivi Interrégional des Performances des Naissains (SIPEN-33)** mis en place par CAPENA : 2 lots de naissains naturels (arcachonnais et charentais), 3 lots 3N et 3 lots 2N mutualisés entre les 4 centres techniques régionaux français. Suivis sur 3 parcs de référence de CAPENA. Dernier échantillonnage au 27/06/2025.
- **Suivi ECOSCOPA de l'Ifremer** : naissains NSI (Naissains Standardisés Ifremer, diploïdes) sur le parc du Tés. Dernier échantillonnage au 25/06/2025.

## Mortalités dans le Bassin d'Arcachon

| Mortalité cumulée moyenne en % | OBS - 33                   | SIPEN - 33                 |                          |                     |                     | ECOSCOPA      |
|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|                                | Lots naturels arcachonnais | Lots naturels arcachonnais | Lots naturels charentais | Lots d'écloserie 2N | Lots d'écloserie 3N | Naissains NSI |
| An 1 (naissains)               | 47,7 (± 6,5)               | 48,9 (± 6,1)               | 43,9 (± 1,7)             | 42,3 (± 4,0)        | 28,3 (± 6,3)        | 52,6 (± 1,3)  |
| An 2 (18 mois)                 | 6,7 (± 5,5)                | 11,9 (± 3,9)               | 12,8 (± 3,9)             | 12,2 (± 5,9)        | 16,6 (± 8,2)        | 4,7 (± 3,0)   |
| An 3 (30 mois)                 | 6,0 (± 2,3)                | 10,3 (± 5,9)               | 7,5 (± 2,7)              | 7,2 (± 2,4)         | 13,1 (± 13,0)       | 2,7 (± 1,5)   |

Rq : Mortalité Observatoire de 44,9 % (An1), 11,5 % (An2) et 8,3 % (An3) sur les parcs en commun pour l'OBS et SIPEN

Les pertes sur les huîtres du suivi SIPEN de 2<sup>ème</sup> année évoluent entre 12 % et 17 % avec les plus faibles valeurs pour les naissains de captage naturel arcachonnais. Les huîtres triploïdes sont les plus touchées par la mortalité en 2<sup>ème</sup> et 3<sup>ème</sup> année d'élevage, avec respectivement 17% et 13%.

Les mortalités cumulées sur le naissain du suivi SIPEN à l'issue du printemps sont comprises entre 28% sur les lots d'huîtres d'écloserie et 49% sur le naissain naturel arcachonnais.

## Mortalités dans les autres bassins de production


### Observatoire national ECOSCOPA

Moyenne des mortalités cumulées par bassin de production sur les huîtres creuses mi-juin 2025.

### Observatoire ostréicole et SIPEN en Charente Maritime – CAPENA

| Mortalité cumulée moyenne en % | OBS - 17                 | SIPEN - 17                 |                          |                     |                     |
|--------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
|                                | Lots naturels charentais | Lots naturels arcachonnais | Lots naturels charentais | Lots d'écloserie 2N | Lots d'écloserie 3N |
| An 1 (naissains)               | 50,9 (±16,7)             | 56,6 (± 0,6)               | 50,4 (± 2,7)             | 45,3 (± 8,1)        | 39,6 (± 15,1)       |
| An 2 (18 mois)                 | 8,9 (± 6,6)              | 14,7 (± 9,9)               | 10,3 (± 2,8)             | 19,8 (± 10,6)       | 24,5 (± 0,7)        |
| An 3 (30 mois)                 | 4,8                      | 6,4                        | 7,2                      | 6,7                 | 12,8                |

Rq : Mortalité Observatoire de 54,3 % (An1), 13,1 % (An2) sur les parcs en commun pour l'OBS-17 et SIPEN-17



## Le mot du CRC et de la DDTM

Quelques professionnels ont constaté des surmortalités sur les huîtres marchandes mi-mai. Un prélèvement d'huîtres moribondes a été réalisé par le GDSO pour analyse de *Vibrio aestuarianus*. Cette analyse a montré une quantité importante de cette bactérie dans l'échantillon.

En cas de constat de mortalités anormales et d'observation d'huîtres moribondes, n'hésitez pas à réaliser un prélèvement, appeler le GDSO et faire vos déclarations sur [www.repamo.fr](http://www.repamo.fr).

Léa Marmion – l.marmion@cape-na.fr

CAPENA – Expertise et Application

05 57 73 08 45 / 06 81 98 30 72 – <http://www.creaa.fr/>