

Créé en 2016, l'Observatoire Ostréicole suit des lots d'huîtres naturelles sur **6 parcs du Bassin d'Arcachon** dans des conditions d'élevage représentatives des pratiques professionnelles locales. Captés sur coupelles par CAPENA sur le site de Maureou, les lots sont placés sur parcs en mars de chaque année (2026 : semaine 12) et élevés pendant 3 ans. Un suivi saisonnier de la **mortalité** et de la **croissance** (gain de poids), ainsi qu'un bilan annuel (fin d'année) sont réalisés sur les lots des trois classes d'âge.

Les résultats ci-dessous représentent l'état des performances des lots à la **fin du printemps 2026** et sont issus des derniers échantillonnages réalisés le **19/06/2026**.

**Tableau 1 : Taux de mortalité (%) ; moyenne) et croissance pondérale (g ; moyenne) des lots d'huîtres de 1<sup>ère</sup>, 2<sup>nd</sup> et 3<sup>ème</sup> année, obtenus à la fin du printemps 2026 (valeurs en gras). Les valeurs de référence correspondent à la moyenne de 9 années de suivi (2017-2025) pour les huîtres des trois classes d'âge. Les flèches représentent l'évolution des tendances actuelles par rapport aux valeurs référence à la même période.**

	Mortalité		Croissance	
<b>1<sup>ère</sup> année</b>	<b>49,6 %</b> (Référence : 41,0 %)	↗	<b>+6,5 g</b> (Référence : +4,8 g) <b>Poids individuel = 7,1 g</b>	↗
<b>2<sup>ème</sup> année</b>	<b>12,7 %</b> (Référence : 8,7 %)	↗	<b>+14,4 g</b> (Référence : +13,4 g) <b>Poids individuel = 37,8 g</b>	↗
<b>3<sup>ème</sup> année</b>	<b>7,4 %</b> (Référence : 6,1 %)	↗	<b>+14,2 g</b> (Référence : +11,9 g) <b>Poids individuel = 63,2 g</b>	↗

## I. Mortalité

A l'issue du printemps 2026, les **mortalités** observées sont, comme les années précédentes, toujours **importantes**.

Les lots de **naissains** ont connu des **mortalités printanières importantes (49,6 %)**, similaires à celles observées les deux années précédentes. Elles sont cependant plus faibles que celles observées en 2023 (57 % en moyenne). Les valeurs obtenues cette année sont comprises entre **44,8 % à Bélisaire** et **57,0 % aux Grahudes**.

Ces surmortalités de naissains ont cette année eu lieu sur les trois premières semaines de mai pour l'ensemble des sites. En effet, très peu de pertes ont été observées entre le 20 mai et le 19 juin sur cette classe d'âge. Au 19 juin 2026, l'épisode de surmortalité printanière semble être achevé sur l'ensemble du Bassin d'Arcachon.

Pour les huîtres de **deuxième année d'élevage**, **Pelourdey (15,2 %)**, **Grahudes (14,8 %)** et **Bélisaire (14,0 %)** présentent les plus importantes mortalités. Ces résultats sont différents des années précédentes où **Arguin** et **Grand Banc** sont généralement les plus impactés. Les trois autres parcs suivis affichent des mortalités un peu plus modérées (**10,8 % en moyenne**), allant

de **10 %** aux **Jalles** à **11,6 %** à **Grand Banc**. Finalement, la moyenne de mortalité observée sur le Bassin d'Arcachon est supérieure à la référence saisonnière (8,7 %).

Les huîtres en **3<sup>ème</sup> année d'élevage** ont quant à elles montré des pertes (**7,4 %**) légèrement supérieures à la référence (6,1 %). **Grand Banc (16,1 %)** et **Arguin (10,6 %)** sont les plus touchés à l'inverse des **Jalles**, quasiment épargné (**1,1 %**).

## II. Croissance

Les **croissances** observées en fin de printemps 2026 sont **élevées** pour les trois classes d'âge d'huîtres en élevage.

A l'échelle du bassin, les **naissains** ont montré des prises de poids supérieures à la moyenne saisonnière (**+6,5 g** ; référence printanière : +4,8 g). Des croissances supérieures à leurs références ont été observées sur l'ensemble des sites. Les prises de poids sont comprises entre **+5 g** à **Bélisaire** et **Grand Banc** à **+8,6 g** à **Arguin**.

Les huîtres de **2<sup>ème</sup> année** ont également bénéficié d'une croissance élevée (**+14,4 g**), proche de la moyenne observée en 2024 et supérieure à la référence (+13,4 g). Les valeurs les plus élevées ont été observées à **Arguin (+18,3 g)** et aux **Jalles (+16,3 g)**. Sur cette classe d'âge, seul le site de **Pelourdey** présente des résultats plus faibles que sa référence saisonnière tandis que **Bélisaire** se trouve proche de la sienne et les autres sites montrent des valeurs supérieures.

Pour les huîtres de **3<sup>ème</sup> année**, le gain en poids moyen à l'issue du printemps 2025 (**+14,2 g**) est supérieure à la moyenne de référence (+11,9 g). Les plus fortes croissances ont été observées aux **Jalles (+18,8 g)** et à **Arguin (+17,2 g)**. **Bélisaire (+12,4 g)** et **Grahudes (+15,9 g)** enregistrent également des prises de poids satisfaisantes par rapport à leurs références. A l'inverse, les sites de **Grand Banc (+9,3 g)** et **Pelourdey (+11,4 g)** sont moins productifs qu'à leur habitude sur cette classe d'âge.

De manière générale, la croissance des huîtres a été importante. Mais des mortalités non négligeables sur les deux plus jeunes classes d'âge d'huîtres sont à déplorer.

*Remerciements : Nous remercions les professionnels partenaires qui nous prêtent des emplacements sur leurs parcs et le CRCAA qui héberge notre antenne à Gujan-Mestras.*

*Citation : **Vieira J, Bechade M, Benetiere F, (2026) Observatoire Ostréicole du Bassin d'Arcachon – Bulletin saisonnier n°1 – Printemps 2026. CAPENA, 2p.***