

Flash Info Mortalités

Bulletin d'information sur les Pertuis Charentais

État sur les mortalités d'huîtres et de moules à la date du 5 juillet 2026

Le Flash Info Mortalités « FIM » présente aux conchyliculteurs une actualité sur les mortalités des mollusques. Les faits et connaissances communiqués sont validés par l'ensemble des partenaires : CAPENA, CRC-17, Ifremer et DDTM.

Les résultats ci-dessous présentent les constats des mortalités d'huître creuse et de la moule commune au cours de la fin du printemps 2026. Les données sont issues des réseaux d'observations de CAPENA et de ses partenaires :

- **Observatoire ostréicole du littoral charentais (OBS-17) de CAPENA** : Naissains naturels charentais sur 12 parcs de référence ([FIM n°0](#)). Dernier échantillonnage au 17/06/2026.
- **Suivi Interrégional du statut zoosanitaire et des Performances des Naissains (SUZON-17)** : 2 lots de naissains naturels (arcachonnais et charentais), 3 lots 3N et 3 lots 2N mutualisés entre les 4 centres techniques régionaux français. Suivis sur 2 parcs de référence de CAPENA ; Dernier échantillonnage au 17/06/2026.
- **Suivi ECOSCOPA de l'Ifremer** : Naissains NSI (Naissains Standardisés Ifremer, diploïdes) sur le parc de D'Agnas ; Dernier échantillonnage au 17/06/2026.
- **Mytilobs** : Observatoire des mortalités de moules d'Ifremer. Dernier échantillonnage au 17/06/2026.

Mortalités des huîtres :

⇒ En Charente-Maritime

Mortalité cumulée moyenne en %	OBS-17	SUZON-17					ECOSCOPA
	Lots naturels charentais	Lots naturels arcachonna	Lots naturels charentais	Lots d'écloserie 2N	Lots d'écloserie 3N	Naissains NSI	
An 1 (naissains)	22,4	45,5	46,5	12,5	37,5	36,3	
An 2 (18 mois)	8,4	4,5	4,5	5,5	6,5	2,5	
An 3 (30 mois)	5,0	4,0	7,0	5,0	2,0	4,6	

Rq : Mortalité An1 Observatoire sur les 2 parcs en commun pour l'OBS et SUZON : 27,5%

⇒ Dans les autres bassins :

Observatoire ostréicole (OBS-33) et SUZON-33 du Bassin d'Arcachon – CAPENA (17/06/2026)

Mortalité cumulée moyenne en %	OBS-33	SUZON-33					ECOSCOPA
	Lots naturels arcachonna	Lots naturels arcachonna	Lots naturels charentais	Lots d'écloserie 2N	Lots d'écloserie 3N	Naissains NSI (17/06/2026)	
An 1 (naissains)	49,5	47	45,6	18,4	28,5	38,5	
An 2 (18 mois)	12,7	23,8	12	16,7	16,3	1,7	
An 3 (30 mois)	7,4	8,1	12,2	7,5	15	2,9	

Rq : Mortalité Observatoire-33 sur les 3 parcs commun pour l'OBS et SUZON : 52,3% (An1), 12,4% (An2) et 10,8% (An3).

La mortalité du naissain d'huîtres NSI en Charente-Maritime est passée en un mois de 19,2% à 36,3%, mais il s'agit du plus faible taux de mortalité observé fin juin depuis 2010 sur le site charentais.

Sur l'ensemble des autres sites français, le naissain NSI a vu sa mortalité fortement augmenter sauf sur Cancale.

Le mot du CRC et de la DDTM

- ⇒ **Mortalités de moules** : Nombreuses remontées du terrain concernant des mortalités de naissains de moules à la suite des fortes augmentations de la température de l'eau, mais seulement 3 déclarations REPAMO réalisées.
- ⇒ Forte inquiétude sur les conséquences des canicules successives sur les huîtres comme sur les moules : n'hésitez pas à faire remonter vos constats.
- ⇒ **Rappel : En cas de constat de mortalité anormale** : les déclarations officielles sont à réaliser via le site www.repamo.fr

Pour toutes informations complémentaires vous pouvez vous adresser à vos référents CRC régionaux (Félix ANSART 06.70.53.46.25 / Aliénor PRIVAT 06.83.19.65.22).

Mortalités de moules :

Les mortalités de naissains d'huîtres apparues mi-mai sur les deux bassins ostréicoles de Nouvelle-Aquitaine (17 et 33), ont peu évolué durant ce dernier mois.


Dans le cadre de SUZON, on observe des valeurs similaires pour les naissains naturels, des valeurs plus élevées sur Arcachon pour les naissains 2N mais plus faibles pour les 3N.

Alors que sur l'Observatoire (naissains naturels issus du bassin suivi), la mortalité moyenne sur 7 parcs est plus élevée sur Arcachon (49,5%) qu'en Charente-Maritime (22,4%).

Les huîtres de 2^{ème} et 3^{ème} année présentent aussi des mortalités plus élevées sur Arcachon qu'en Charente-Maritime.

Dans les pertuis charentais, signalement de mortalités sur des naissains de moules par des professionnels.

Le suivi Mytilobs montre 20,5% de mortalité cumulée au 17/06/2026 sur Boyard, valeur équivalente à celle de 2025 à la même période.



% Mortalités cumulées	An1	An2	An3
Baie des Veys	23,6	9,1	0,7
Cancale	2,9	2	2
Rade de Brest	32,8	5	2,3
Penerf	17,4	5,2	2,3
Baie de Bourgneuf	40,6	12,9	5
Thau	Abs données	0,9	1,3

Bouquet Anne-Lise – al.bouquet@cape-na.fr
 CAPENA – Expertise et Application
 05 46 47 49 52 – www.cape-na.fr