



Prélèvements du 16 juillet 2026
 BM = 13h52


	Lieu de prélèvement	Température de l'eau -1m (°C)	Salinité -1m (‰)	Quantité de larves / 1,5m ³			
				Stades			
				Petites	Petites évoluées	Moyennes	Grosses
Secteur Est	Arams	27,0	33,4	113 050 ↗	22 000 ↘	1 400 ↗	0 ⇔
	Gujan	27,9	32,6	17 580 ↗	5 660 ↘	750 ↗	100 ↗
	Comprian	27,4	32,9	60 000 ↗	23 500 ↗	4 160 ↗	160 ↗
Secteur Ouest	Courbey	24,4	34,3	89 640 ↗	9 370 ↘	0 ⇔	0 ⇔
	Piquey	26,2	33,9	212 320 ↗	34 680 ↗	360 ↗	40 ↗
	Arès	26,3	33,8	179 120 ↗	35 720 ↗	240 ↗	0 ↘
	Arguin	23,9	34,5	11 250 ↘	1 680 ↘	0 ↘	0 ⇔
Moyenne		26,2	33,6	97 566	18 944	987	43

Appréciation des quantités de larves en comparaison avec les références par stades larvaires : Abaque basé sur les résultats obtenus depuis 1993 ; Sources Ifremer et CAPENA.

Appréciation des quantités de larves

Faible
Modérée
Forte

Evolution de la température et de la salinité de l'eau à -1m




Références des températures et salinités de l'eau sur le Bassin d'Arcachon – données Ifremer réseau ARCHYD

La **température de l'eau** est très largement supérieure (+4,1°C) à la moyenne de référence 2006-2025.

La **salinité** est supérieure (+0,7‰) à la moyenne de référence 2006-2024.

Evolution des cohortes de larves d'huîtres en 2026



Secteur Est : Quantités élevées de larves aux stades *petites*, *petites évoluées* et *moyennes* sur l'ensemble des points. Quantités modérées de larves au stade *grosses* à Gujan et Comprian, aucune observation de larve à ce stade à Arams.

Secteur Ouest : Quantités élevées de larves aux stades *petites* et *petites évoluées* sur l'ensemble des sites. Quantité élevée au stade *moyennes* à Piquey, et modérée à Arès, pas d'observation sur les autres points. Quantité faible de larve au stade *grosses* à Piquey, aucune observation sur les autres points.

Prochains prélèvements de larves d'huîtres le 20 juillet 2026.

Marion Béchade – m.bechade@cape-na.fr
 CAPENA – Expertise et Application

05 57 73 08 45 / 06 81 98 30 72 – <https://www.cape-na.fr/>