





Prélèvements du 6 juillet 2026
BM = 16h13

	Lieu de prélèvement	Température de l'eau -1m (°C)	Salinité -1m (‰)	Quantité de larves / 1,5m ³			
				Stades			
				Petites	Petites évoluées	Moyennes	Grosses
Secteur Est	Arams	26,3	32,3	2 520 ↘	125 ↘	175 ↘	1 680 ↗
	Gujan	27,5	31,7	760 ↘	120 ↘	640 ↘	4 600 ↗
	Comprian	26,4	32,0	2 350 ↗	135 ↘	200 ↘	3 440 ↗
Secteur Ouest	Courbey	23,5	33,8	2 280 ↗	190 ↘	35 ↘	175 ↗
	Piquey	25,0	33,5	2 320 ↗	365 ↘	665 ↗	2 320 ↗
	Arès	25,8	33,4	150 ↘	410 ↘	4 200 ↗	15 240 ↗
	Arguin	20,6	34,7	1 035 ↗	135 ↘	35 ↗	105 ↗
Moyenne		25,0	33,1	1 631	211	850	3 937

Appréciation des quantités de larves en comparaison avec les références par stades larvaires : Abaque basé sur les résultats obtenus depuis 1993 ; Sources Ifremer et CAPENA.

Appréciation des quantités de larves
 Faible Modérée Forte



Références des températures et salinités de l'eau sur le Bassin d'Arcachon – données Ifremer réseau ARCHYD

La **température de l'eau** est très largement supérieure (+3,4°C) à la moyenne de référence 2006-2025.

La **salinité** est supérieure (+0,5‰) à la moyenne de référence 2006-2024.

Secteur Est : Quantités faibles de larves d'huîtres aux stades *petites* et *petites évoluées* sur l'ensemble des points. Quantité élevée au stade *moyennes* à Gujan et quantités modérées sur les autres sites. Quantités élevées de larves au stade *grosses* sur l'ensemble des points.

Secteur Ouest : Quantités faibles de larves d'huîtres aux stades *petites* sur l'ensemble des points. Quantités modérées au stade *petites évoluées* à Piquey et Arès, et faibles sur les autres sites. Quantités élevées aux stades *moyennes* et *grosses* à Piquey et Arès, et quantités faibles à modérées selon les stades sur les autres points.

Prochains prélèvements de larves d'huîtres le 9 juillet 2026.

Marion Béchade – m.bechade@cape-na.fr
CAPENA – Expertise et Application

05 57 73 08 45 / 06 81 98 30 72 – <https://www.cape-na.fr/>