


Suivi des émissions de larves de moules dans le Bassin d'Arcachon

Bulletins des résultats
de l'année 2026



Rapport d'avancement 2026

Rédaction : Marion Béchade

Juillet 2026

Marion Béchade , Fanny Bénetière Programme : Suivi des larves de moules dans le Bassin d’Arcachon	Centre pour l’Aquaculture, la Pêche et l’Environnement de Nouvelle-Aquitaine
Suivi des émissions de larves de moules dans le Bassin d’Arcachon – Rapport d’avancement 2026	
Rapport d’avancement 27 pages	Juillet 2026
Béchade M. et al. (2026) Suivi des émissions de larves de moules dans le Bassin d’Arcachon – Rapport d’avancement 2026. CAPENA, 27p.	
Ce rapport d’avancement présente les 25 bulletins issus des 25 marées de prélèvements de larves de moules ayant pu être réalisées cette année 2026 dans le Bassin d’Arcachon. Au départ ce sont 27 marées qui étaient prévues dans le cahier des charges mais deux d’entre elles (09/01 et 23/01) n’ont pas pu être assurées en raison de mauvaises conditions météorologiques limitant l’accès aux zones de prélèvement. Le suivi hebdomadaire s’est ainsi déroulé du 14 janvier au 9 juillet 2026. Les 25 marées ont été réalisées à une fréquence hebdomadaire sur 5 points répartis sur l’ensemble du Bassin d’Arcachon (Arguin, Ferret, Courbey, Piquey et la Humeyre). CAPENA a donc réalisé en 2026 un total de 125 prélèvements.	



Prélèvements du 14 janvier 2026
 PM = 14h34 – coefficient 39


Lieu de prélèvement	Température de l'eau -1m (°C)	Salinité -1m (‰)	Quantité de larves / 1,5m ³		
			Stades		
			Petites (<0,11mm)	Moyennes (0,11 à 0,2mm)	Grosses (>0,2mm)
Arguin	11,3	34,7	8	0	0
Ferret	10,0	32,9	35	30	0
Courbey	9,0	30,4	30	0	0
Piquey	8,7	28,1	0	0	0
Humeyre	9,0	29,4	0	0	0
Moyenne	9,6	31,1	15	6	0

Appréciation des quantités de larves en comparaison avec les références par stades larvaires : Abaque basé sur les résultats de l'ensemble des points obtenus depuis 2016 (Arguin et Courbey) et 2018 (Ferret, Piquey, Humeyre) ; Source CAPENA.

Appréciation des quantités de larves

Faible
Modérée
Forte

Evolution de la température et de la salinité de l'eau à -1m




Références des températures et salinités de l'eau sur le Bassin d'Arcachon – données Ifremer réseau ARCHYD

La **température de l'eau** est légèrement supérieure (+ 0.2°C) à la moyenne de référence 2006-2025.

La **salinité** est supérieure (+ 0.6 ‰) la moyenne de référence 2006-2025.

Evolution des cohortes de larves de moules en 2026



Présence de larves de moules au stade *petites* en faibles quantités sur les sites Arguin, Ferret et Courbey. Pas d'observation sur les autres points.

Présence de larves de moules au stade *moyennes* en quantité faible au Ferret. Pas d'observation sur les autres sites.

Pas d'observation de larves de moules au stade *grosse* sur l'ensemble des sites.

Prochains prélèvements de larves de moules le 23 janvier 2026.

Marion BÉCHADE – m.bechade@cape-na.fr
 CAPENA – Expertise et Application

05 57 73 08 45 / 06 81 98 30 72 – <https://www.cape-na.fr/>



Prélèvements du 28 janvier 2026
 PM = 13h02 – coefficient 47


Lieu de prélèvement	Température de l'eau -1m (°C)	Salinité -1m (‰)	Quantité de larves / 1,5m ³		
			Stades		
			Petites (<0,11mm)	Moyennes (0,11 à 0,2mm)	Grosses (>0,2mm)
Arguin	12,0	34,0	560 ↗	140 ↗	0 ⇨
Ferret	11,7	33,2	420 ↗	0 ↘	0 ⇨
Courbey	10,9	30,8	3 010 ↗	410 ↗	0 ⇨
Piquey	10,0	26,8	1 110 ↗	150 ↗	0 ⇨
Humeyre	10,4	28,3	540 ↗	240 ↗	0 ⇨
Moyenne	11,0	30,6	1 128	188	0

Appréciation des quantités de larves en comparaison avec les références par stades larvaires : Abaque basé sur les résultats de l'ensemble des points obtenus depuis 2016 (Arguin et Courbey) et 2018 (Ferret, Piquey, Humeyre) ; Source CAPENA.

Appréciation des quantités de larves

Faible
Modérée
Forte

Evolution de la température et de la salinité de l'eau à -1m




Références des températures et salinités de l'eau sur le Bassin d'Arcachon – données Ifremer réseau ARCHYD

La **température de l'eau** est supérieure (+ 1.3°C) à la moyenne de référence 2006-2025.

La **salinité** est légèrement supérieure (+ 0.2 ‰) la moyenne de référence 2006-2025.

Evolution des cohortes de larves de moules en 2026



Présence de larves de moules au stade *petites* en quantité élevée au Courbey, en quantité modérée à Piquey et en faibles quantités sur les autres sites.

Présence de larves de moules au stade *moyennes* en quantité modérée au Courbey et en faibles quantités sur les sites Arguin, Piquey et la Humeyre. Pas d'observation de larves à ce stade au Ferret.

Pas d'observation de larves de moules au stade *grosses* sur l'ensemble des sites.

Prochains prélèvements de larves de moules le 6 février 2026.

Marion BÉCHADE – m.bechade@cape-na.fr
 CAPENA – Expertise et Application

05 57 73 08 45 / 06 81 98 30 72 – <https://www.cape-na.fr/>



Prélèvements du 5 février 2026
PM = 7h43 – coefficient 94


Lieu de prélèvement	Température de l'eau -1m (°C)	Salinité -1m (‰)	Quantité de larves / 1,5m ³		
			Stades		
			Petites (<0,11mm)	Moyennes (0,11 à 0,2mm)	Grosses (>0,2mm)
Arguin	12,1	33,8	330 ↘	0 ↘	0 ⇨
Ferret	11,9	33,2	180 ↘	30 ↗	0 ⇨
Courbey	11,7	33,1	120 ↘	120 ↘	0 ⇨
Piquey	10,5	26,3	105 ↘	35 ↘	0 ⇨
Humeyre	11,3	30,7	200 ↘	160 ↘	0 ⇨
Moyenne	11,5	31,4	187	69	0

Appréciation des quantités de larves en comparaison avec les références par stades larvaires : Abaque basé sur les résultats de l'ensemble des points obtenus depuis 2016 (Arguin et Courbey) et 2018 (Ferret, Piquey, Humeyre) ; Source CAPENA.

Appréciation des quantités de larves

Faible
Modérée
Forte

Evolution de la température et de la salinité de l'eau à -1m




Références des températures et salinités de l'eau sur le Bassin d'Arcachon – données Ifremer réseau ARCHYD

La **température de l'eau** est supérieure (+ 1.6°C) à la moyenne de référence 2006-2025.

La **salinité** est supérieure (+ 1.1 ‰) la moyenne de référence 2006-2025.

Evolution des cohortes de larves de moules en 2026



Présence de larves de moules au stade *petites* en faibles quantités sur l'ensemble des sites.

Présence de larves de moules au stade *moyennes* en quantités faibles sur l'ensemble des points, hormis à Arguin site sur lequel aucune larve n'a été observée à ce stade.

Pas d'observation de larves de moules au stade *grosses* sur l'ensemble des sites.

Prochains prélèvements de larves de moules le 12 février 2026.

Marion BÉCHADE – m.bechade@cape-na.fr
CAPENA – Expertise et Application

05 57 73 08 45 / 06 81 98 30 72 – <https://www.cape-na.fr/>



Prélèvements du 9 février 2026

PM = 10h02 – coefficient 46


Lieu de prélèvement	Température de l'eau -1m (°C)	Salinité -1m (‰)	Quantité de larves / 1,5m ³		
			Stades		
			Petites (<0,11mm)	Moyennes (0,11 à 0,2mm)	Grosses (>0,2mm)
Arguin	12,0	33,4	870 ↗	660 ↗	0 →
Ferret	11,7	31,3	2 850 ↗	120 ↗	0 →
Courbey	11,3	28,7	3 480 ↗	210 ↗	0 →
Piquey	10,5	22,3	1 080 ↗	210 ↗	0 →
Humeyre	11,1	27,2	210 ↗	30 ↘	0 →
Moyenne	11,3	28,6	1 698	246	0

Appréciation des quantités de larves en comparaison avec les références par stades larvaires : Abaque basé sur les résultats de l'ensemble des points obtenus depuis 2016 (Arguin et Courbey) et 2018 (Ferret, Piquey, Humeyre) ; Source CAPENA.

Appréciation des quantités de larves

Faible
Modérée
Forte

Evolution de la température et de la salinité de l'eau à -1m




Références des températures et salinités de l'eau sur le Bassin d'Arcachon – données Ifremer réseau ARCHYD

La **température de l'eau** est supérieure (+ 1.3°C) à la moyenne de référence 2006-2025.

La **salinité** est très inférieure (- 1.8‰) la moyenne de référence 2006-2025.

Evolution des cohortes de larves de moules en 2026



Présence de larves de moules au stade *petites* en quantité importante au Courbey, en quantités modérées au Ferret et à Piquey et en faibles quantités sur les deux autres sites.

Présence de larves de moules au stade *moyennes* en quantité modérée à Arguin et en faibles quantités sur tous les autres points.

Pas d'observation de larves de moules au stade *grosses* sur l'ensemble des sites.

Prochains prélèvements de larves de moules le 16 février 2026.

Marion BÉCHADE – m.bechade@cape-na.fr
CAPENA – Expertise et Application

05 57 73 08 45 / 06 81 98 30 72 – <https://www.cape-na.fr/>



Prélèvements du 17 février 2026
PM = 17h50 – coefficient 82


Lieu de prélèvement	Température de l'eau -1m (°C)	Salinité -1m (‰)	Quantité de larves / 1,5m ³		
			Stades		
			Petites (<0,11mm)	Moyennes (0,11 à 0,2mm)	Grosses (>0,2mm)
Arguin	Prélèvement non réalisé : conditions météorologiques défavorables				
Ferret	12,3	33,3	160 ↘	265 ↗	0 ⇔
Courbey	12,2	32,9	50 ↘	220 ↗	0 ⇔
Piquey	11,7	28,0	0 ↘	50 ↘	0 ⇔
Humeyre	11,4	24,1	60 ↘	270 ↗	0 ⇔
Moyenne	11,9	29,6	68	201	0

Appréciation des quantités de larves en comparaison avec les références par stades larvaires : Abaque basé sur les résultats de l'ensemble des points obtenus depuis 2016 (Arguin et Courbey) et 2018 (Ferret, Piquey, Humeyre) ; Source CAPENA.

Appréciation des quantités de larves

Faible
Modérée
Forte

Evolution de la température et de la salinité de l'eau à -1m




Références des températures et salinités de l'eau sur le Bassin d'Arcachon – données Ifremer réseau ARCHYD

La **température de l'eau** est supérieure (+ 1.6°C) à la moyenne de référence 2006-2025.

La **salinité** est inférieure (- 0.8‰) la moyenne de référence 2006-2025.

Evolution des cohortes de larves de moules en 2026



Présence de larves de moules au stade *petites* en quantités faibles au Ferret, au Courbey et à la Humeyre. Absence d'observation de larves de moules à ce stade à Piquey.

Présence de larves de moules au stade *moyennes* en faibles quantités sur l'ensemble des points.

Pas d'observation de larves de moules au stade *grosses* sur l'ensemble des sites.

Prochains prélèvements de larves de moules le 23 février 2026.

Marion BÉCHADE – m.bechade@cape-na.fr
CAPENA – Expertise et Application

05 57 73 08 45 / 06 81 98 30 72 – <https://www.cape-na.fr/>





Prélèvements du 23 février 2026
PM = 09h12 – coefficient 74

Lieu de prélèvement	Température de l'eau -1m (°C)	Salinité -1m (‰)	Quantité de larves / 1,5m ³		
			Stades		
			Petites (<0,11mm)	Moyennes (0,11 à 0,2mm)	Grosses (>0,2mm)
Arguin	12,2	32,8	300	210	0
Ferret	12,1	31,3	90	30	0
Courbey	11,7	26,1	30	90	0
Piquey	11,7	21,1	990	30	0
Humeyre	11,8	23,7	90	0	0
Moyenne	11,9	27,0	300	72	0

Appréciation des quantités de larves en comparaison avec les références par stades larvaires : Abaque basé sur les résultats de l'ensemble des points obtenus depuis 2016 (Arguin et Courbey) et 2018 (Ferret, Piquey, Humeyre) ; Source CAPENA.

Appréciation des quantités de larves

Faible Modérée Forte



Références des températures et salinités de l'eau sur le Bassin d'Arcachon – données Ifremer réseau ARCHYD

La **température de l'eau** est supérieure (+ 1.4°C) à la moyenne de référence 2006-2025.

La **salinité** est très largement inférieure (- 3.4‰) à la moyenne de référence 2006-2025.

Présence de larves de moules au stade *petites* en quantités faibles sur l'ensemble des points.

Présence de larves de moules au stade *moyennes* en faibles quantités sur l'ensemble des points, hormis à la Humeyre où aucune larve à ce stade n'a été observée.

Pas d'observation de larves de moules au stade *grosses* sur l'ensemble des sites.

Prochains prélèvements de larves de moules le 2 mars 2026.

Marion BÉCHADE – m.bechade@cape-na.fr
CAPENA – Expertise et Application

05 57 73 08 45 / 06 81 98 30 72 – <https://www.cape-na.fr/>



Prélèvements du 2 mars 2026
PM = 17h09 – coefficient 90


Lieu de prélèvement	Température de l'eau -1m (°C)	Salinité -1m (‰)	Quantité de larves / 1,5m ³		
			Stades		
			Petites (<0,11mm)	Moyennes (0,11 à 0,2mm)	Grosses (>0,2mm)
Arguin	13,2	32,4	0	0	35
Ferret	13,0	31,4	0	145	35
Courbey	13,0	31,1	120	120	0
Piquey	13,3	22,9	210	30	0
Humeyre	12,9	25,7	0	0	0
Moyenne	13,1	28,7	66	59	14

Appréciation des quantités de larves en comparaison avec les références par stades larvaires : Abaque basé sur les résultats de l'ensemble des points obtenus depuis 2016 (Arguin et Courbey) et 2018 (Ferret, Piquey, Humeyre) ; Source CAPENA.


Appréciation des quantités de larves

Faible
Modérée
Forte

Evolution de la température et de la salinité de l'eau à -1m



Evolution des cohortes de larves de moules en 2026



Références des températures et salinités de l'eau sur le Bassin d'Arcachon – données Ifremer réseau ARCHYD

La **température de l'eau** est très supérieure (+ 2.2°C) à la moyenne de référence 2006-2025.

La **salinité** est bien inférieure (- 1.8‰) à la moyenne de référence 2006-2025.

Présence de larves de moules au stade *petites* en quantités faibles au Courbey et à Piquey. Pas d'observation de larves de moules à ce stade sur les autres points.

Présence de larves de moules au stade *moyennes* en faibles quantités au Ferret, au Courbey et à Piquey. Pas d'observation de larves de moules à ce stade sur les deux autres sites.

Quantités faibles de larves de moules au stade *grosses* à Arguin et au Ferret. Pas d'observation à ce stade sur les autres sites.

Prochains prélèvements de larves de moules le 10 mars 2026.

Marion BÉCHADE – m.bechade@cape-na.fr
CAPENA – Expertise et Application

05 57 73 08 45 / 06 81 98 30 72 – <https://www.cape-na.fr/>




Prélèvements du 10 mars 2026
 PM = 9h12 – coefficient 48

Lieu de prélèvement	Température de l'eau -1m (°C)	Salinité -1m (‰)	Quantité de larves / 1,5m ³		
			Stades		
			Petites (<0,11mm)	Moyennes (0,11 à 0,2mm)	Grosses (>0,2mm)
Arguin	13,1	33,0	1 880 ↗	2 800 ↗	120 ↗
Ferret	13,3	30,3	1 760 ↗	1 580 ↗	0 ↘
Courbey	13,2	26,6	320 ↗	220 ↗	0 →
Piquey	13,3	23,0	1 490 ↗	295 ↗	25 ↗
Humeyre	13,4	26,4	910 ↗	405 ↗	0 →
Moyenne	13,3	27,9	1 272	1 060	29

Appréciation des quantités de larves en comparaison avec les références par stades larvaires : Abaque basé sur les résultats de l'ensemble des points obtenus depuis 2016 (Arguin et Courbey) et 2018 (Ferret, Piquey, Humeyre) ; Source CAPENA.

Appréciation des quantités de larves


Faible
Modérée
Forte



Références des températures et salinités de l'eau sur le Bassin d'Arcachon – données Ifremer réseau ARCHYD

La **température de l'eau** est très supérieure (+ 2.0°C) à la moyenne de référence 2006-2025.

La **salinité** est largement inférieure (- 2.7‰) à la moyenne de référence 2006-2025.



Présence de larves de moules au stade *petites* en quantités modérées à Arguin, au Ferret et à Piquey. Présence en faibles quantités sur les autres points.

Présence de larves de moules au stade *moyennes* en quantités élevées à Arguin et au Ferret, en quantités modérées à la Humeyre et en faibles quantités sur les deux autres sites.

Quantité modérée de larves de moules au stade *grosses* à Arguin, et en faible quantité à Piquey. Pas d'observation à ce stade sur les autres sites.

Prochains prélèvements de larves de moules le 16 mars 2026.

Marion BÉCHADE – m.bechade@cape-na.fr
 CAPENA – Expertise et Application

05 57 73 08 45 / 06 81 98 30 72 – <https://www.cape-na.fr/>




Prélèvements du 16 mars 2026
 PM = 16h07 – coefficient 66

Lieu de prélèvement	Température de l'eau -1m (°C)	Salinité -1m (‰)	Quantité de larves / 1,5m ³		
			Stades		
			Petites (<0,11mm)	Moyennes (0,11 à 0,2mm)	Grosses (>0,2mm)
Arguin	13,6	32,8	525	320	0
Ferret	13,5	31,6	790	520	40
Courbey	14,1	27,5	920	525	50
Piquey	13,8	25,6	450	105	0
Humeyre	13,7	25,6	70	0	0
Moyenne	13,7	28,6	551	294	18

Appréciation des quantités de larves en comparaison avec les références par stades larvaires : Abaque basé sur les résultats de l'ensemble des points obtenus depuis 2016 (Arguin et Courbey) et 2018 (Ferret, Piquey, Humeyre) ; Source CAPENA.

Appréciation des quantités de larves


Faible
Modérée
Forte



Références des températures et salinités de l'eau sur le Bassin d'Arcachon – données Ifremer réseau ARCHYD

La **température de l'eau** est très supérieure (+ 2.1°C) à la moyenne de référence 2006-2025.

La **salinité** est très inférieure (- 2.0‰) à la moyenne de référence 2006-2025.



Présence de larves de moules au stade *petites* en quantités faibles sur l'ensemble des points.

Présence de larves de moules au stade *moyennes* en quantités modérées à Arguin, au Ferret et au Courbey, et en quantité faible à Piquey. Pas d'observation à la Humeyre.

Quantité modérée de larves de moules au stade *grosses* au Courbey, et faible quantité observée au Ferret. Pas d'observation à ce stade sur les autres sites.

Prochains prélèvements de larves de moules le 24 mars 2026.

Marion BÉCHADE – m.bechade@cape-na.fr
 CAPENA – Expertise et Application

05 57 73 08 45 / 06 81 98 30 72 – <https://www.cape-na.fr/>




Prélèvements du 24 mars 2026
 PM = 8h55 – coefficient 74

Lieu de prélèvement	Température de l'eau -1m (°C)	Salinité -1m (‰)	Quantité de larves / 1,5m ³		
			Stades		
			Petites (<0,11mm)	Moyennes (0,11 à 0,2mm)	Grosses (>0,2mm)
Arguin	13,0	34,3	2 250 ↗	110 ↘	0 →
Ferret	13,3	33,5	1 950 ↗	195 ↘	0 ↘
Courbey	13,6	31,5	2 100 ↗	180 ↘	0 ↘
Piquey	13,9	27,9	875 ↗	105 →	0 →
Humeyre	14,1	28,4	120 ↗	0 →	0 →
Moyenne	13,6	31,1	1 459	118	0

Appréciation des quantités de larves en comparaison avec les références par stades larvaires : Abaque basé sur les résultats de l'ensemble des points obtenus depuis 2016 (Arguin et Courbey) et 2018 (Ferret, Piquey, Humeyre) ; Source CAPENA.

Appréciation des quantités de larves


Faible
Modérée
Forte



Références des températures et salinités de l'eau sur le Bassin d'Arcachon – données Ifremer réseau ARCHYD

La **température de l'eau** est supérieure (+ 1.5°C) à la moyenne de référence 2006-2025.

La **salinité** est légèrement supérieure (+ 0.4‰) à la moyenne de référence 2006-2025.



Présence de larves de moules au stade *petites* en quantités modérées à Arguin, au Ferret et au Courbey, et en faibles quantités sur les autres points.

Présence de larves de moules au stade *moyennes* en quantités faibles sur l'ensemble des sites, hormis à la Humeyre où aucune observation n'a été relevée.

Aucune observation de larves de moules au stade *grosses* sur l'ensemble des sites.

Prochains prélèvements de larves de moules le 30 mars 2026.

Marion BÉCHADE – m.bechade@cape-na.fr
 CAPENA – Expertise et Application

05 57 73 08 45 / 06 81 98 30 72 – <https://www.cape-na.fr/>



Prélèvements du 31 mars 2026


PM = 17h46 – coefficient 82

Lieu de prélèvement	Température de l'eau -1m (°C)	Salinité -1m (‰)	Quantité de larves / 1,5m ³		
			Stades		
			Petites (<0,11mm)	Moyennes (0,11 à 0,2mm)	Grosses (>0,2mm)
Arguin	12,9	34,8	300	120	270
Ferret	12,8	34,4	630	165	60
Courbey	13,2	32,4	315	0	0
Piquey	13,1	30,1	90	45	30
Humeyre	13,2	29,0	0	50	180
Moyenne	13,0	32,1	267	76	108

Appréciation des quantités de larves en comparaison avec les références par stades larvaires : Abaque basé sur les résultats de l'ensemble des points obtenus depuis 2016 (Arguin et Courbey) et 2018 (Ferret, Piquey, Humeyre) ; Source CAPENA.

Appréciation des quantités de larves


Faible
Modérée
Forte



Références des températures et salinités de l'eau sur le Bassin d'Arcachon – données Ifremer réseau ARCHYD

La **température de l'eau** est légèrement supérieure (+ 0.4°C) à la moyenne de référence 2006-2025.

La **salinité** est supérieure (+ 1.3‰) à la moyenne de référence 2006-2025.



Présence de larves de moules au stade *petites* en quantités faibles sur tous les points, hormis à la Humeyre où aucune larve n'a été observée.

Présence de larves de moules au stade *moyennes* en quantités faibles sur l'ensemble des sites, hormis au Courbey où aucune observation n'a été relevée.

Présence de larves de moules au stade *grosses* en quantités élevées à Arguin et la Humeyre, en quantité modérée au Ferret et faible à Piquey. Pas observation de larves à ce stade au Courbey.

Prochains prélèvements de larves de moules le 8 avril 2026.

Marion BÉCHADE – m.bechade@cape-na.fr
CAPENA – Expertise et Application

05 57 73 08 45 / 06 81 98 30 72 – <https://www.cape-na.fr/>



Prélèvements du 9 avril 2026

PM = 10h28 – coefficient 37


Lieu de prélèvement	Température de l'eau -1m (°C)	Salinité -1m (‰)	Quantité de larves / 1,5m ³		
			Stades		
			Petites (<0,11mm)	Moyennes (0,11 à 0,2mm)	Grosses (>0,2mm)
Arguin	14,0	34,7	960 ↗	320 ↗	60 ↘
Ferret	14,4	33,4	7 280 ↗	410 ↗	30 ↘
Courbey	15,5	31,8	6 940 ↗	1 350 ↗	0 ⇔
Piquey	15,9	30,3	670 ↗	40 ↘	0 ↘
Humeyre	16,3	30,1	990 ↗	60 ↗	210 ↗
Moyenne	15,2	32,1	3 368	436	60

Appréciation des quantités de larves en comparaison avec les références par stades larvaires : Abaque basé sur les résultats de l'ensemble des points obtenus depuis 2016 (Arguin et Courbey) et 2018 (Ferret, Piquey, Humeyre) ; Source CAPENA.

Appréciation des quantités de larves

Faible
Modérée
Forte

Evolution de la température et de la salinité de l'eau à -1m




Références des températures et salinités de l'eau sur le Bassin d'Arcachon – données Ifremer réseau ARCHYD

La **température de l'eau** est très supérieure (+ 2.0°C) à la moyenne de référence 2006-2025.

La **salinité** est supérieure (+ 1.1‰) à la moyenne de référence 2006-2025.

Evolution des cohortes de larves de moules en 2026



Présence de larves de moules au stade *petites* en quantités élevées au Ferret et au Courbey et en faibles quantités sur les autres points.

Présence de larves de moules au stade *moyennes* en quantité élevée au Courbey, en quantités modérées à Arguin et au Ferret, et faibles à Piquey et la Humeyre.

Présence de larves de moules au stade *grosses* en quantité élevée à la Humeyre, modérée à Arguin et faible au Ferret. Pas observation de larves à ce stade sur les deux autres points.

Prochains prélèvements de larves de moules le 14 avril 2026.

Marion BÉCHADE – m.bechade@cape-na.fr
CAPENA – Expertise et Application

05 57 73 08 45 / 06 81 98 30 72 – <https://www.cape-na.fr/>




Prélèvements du 14 avril 2026
 PM = 16h27 – coefficient 66

Lieu de prélèvement	Température de l'eau -1m (°C)	Salinité -1m (‰)	Quantité de larves / 1,5m ³		
			Stades		
			Petites (<0,11mm)	Moyennes (0,11 à 0,2mm)	Grosses (>0,2mm)
Arguin	15,0	34,3	300	545	140
Ferret	14,9	34,2	840	1 065	70
Courbey	15,2	33,8	880	1 135	140
Piquey	16,3	30,7	320	855	0
Humeyre	16,3	31,0	200	370	0
Moyenne	15,5	32,8	508	794	70

Appréciation des quantités de larves en comparaison avec les références par stades larvaires : Abaque basé sur les résultats de l'ensemble des points obtenus depuis 2016 (Arguin et Courbey) et 2018 (Ferret, Piquey, Humeyre) ; Source CAPENA.

Appréciation des quantités de larves


Faible
Modérée
Forte



Références des températures et salinités de l'eau sur le Bassin d'Arcachon – données Ifremer réseau ARCHYD

La **température de l'eau** est supérieure (+ 1.9°C) à la moyenne de référence 2006-2025.

La **salinité** est supérieure (+ 1.8‰) à la moyenne de référence 2006-2025.



Présence de larves de moules au stade *petites* en quantités faibles sur l'ensemble des points.

Présence de larves de moules au stade *moyennes* en quantités élevées au Ferret et au Courbey et en quantités modérées sur les autres sites.

Présence de larves de moules au stade *grosses* en quantités modérées à Arguin, au Ferret et au Courbey. Pas observation de larves à ce stade sur les deux autres points.

Prochains prélèvements de larves de moules le 21 avril 2026.

Marion BÉCHADE – m.bechade@cape-na.fr
 CAPENA – Expertise et Application

05 57 73 08 45 / 06 81 98 30 72 – <https://www.cape-na.fr/>



Prélèvements du 21 avril 2026
 PM = 08h57 – coefficient 35


Lieu de prélèvement	Température de l'eau -1m (°C)	Salinité -1m (‰)	Quantité de larves / 1,5m ³		
			Stades		
			Petites (<0,11mm)	Moyennes (0,11 à 0,2mm)	Grosses (>0,2mm)
Arguin	14,0	34,8	2 000 ↗	760 ↗	400 ↗
Ferret	14,6	34,5	990 ↗	505 ↘	70 ↔
Courbey	14,6	34,5	450 ↘	375 ↘	510 ↗
Piquey	16,9	31,3	4 430 ↗	270 ↘	300 ↗
Humeyre	17,0	31,9	200 ↔	140 ↘	60 ↗
Moyenne	15,4	33,4	1 614	410	268

Appréciation des quantités de larves en comparaison avec les références par stades larvaires : Abaque basé sur les résultats de l'ensemble des points obtenus depuis 2016 (Arguin et Courbey) et 2018 (Ferret, Piquey, Humeyre) ; Source CAPENA.

Appréciation des quantités de larves

Faible
Modérée
Forte

Evolution de la température et de la salinité de l'eau à -1m




Références des températures et salinités de l'eau sur le Bassin d'Arcachon – données Ifremer réseau ARCHYD

La **température de l'eau** est supérieure (+ 1.2°C) à la moyenne de référence 2006-2025.

La **salinité** est très supérieure (+ 2.2‰) à la moyenne de référence 2006-2025.

Evolution des cohortes de larves de moules en 2026



Présence de larves de moules au stade *petites* en quantité élevée à Piquey, modérée à Arguin et en faibles quantités sur les autres points.

Présence de larves de moules au stade *moyennes* en quantités modérées à Arguin, au Ferret et au Courbey et en quantités faibles sur les deux autres sites.

Présence de larves de moules au stade *grosses* en quantités élevées à Arguin, au Courbey et à Piquey et en quantités modérées sur les deux autres points.

Prochains prélèvements de larves de moules le 29 avril 2026.

Marion BÉCHADE – m.bechade@cape-na.fr
 CAPENA – Expertise et Application

05 57 73 08 45 / 06 81 98 30 72 – <https://www.cape-na.fr/>




Prélèvements du 29 avril 2026
 PM = 17h16 – coefficient 77

Lieu de prélèvement	Température de l'eau -1m (°C)	Salinité -1m (‰)	Quantité de larves / 1,5m ³		
			Stades		
			Petites (<0,11mm)	Moyennes (0,11 à 0,2mm)	Grosses (>0,2mm)
Arguin	16,5	34,5	160	345	70
Ferret	16,8	34,1	1 215	1 780	105
Courbey	16,8	34,2	405	825	330
Piquey	19,1	31,6	500	555	35
Humeyre	18,6	32,0	495	440	35
Moyenne	17,6	33,3	555	789	115

Appréciation des quantités de larves en comparaison avec les références par stades larvaires : Abaque basé sur les résultats de l'ensemble des points obtenus depuis 2016 (Arguin et Courbey) et 2018 (Ferret, Piquey, Humeyre) ; Source CAPENA.

Appréciation des quantités de larves


Faible
Modérée
Forte



Références des températures et salinités de l'eau sur le Bassin d'Arcachon – données Ifremer réseau ARCHYD

La **température de l'eau** est largement supérieure (+ 2.6°C) à la moyenne de référence 2006-2025.

La **salinité** est supérieure (+ 1.9‰) à la moyenne de référence 2006-2025.



Présence de larves de moules au stade *petites* en quantité modérée au Ferret et en faibles quantités sur les autres points.

Présence de larves de moules au stade *moyennes* en quantité élevée au Ferret et en quantités modérées sur les autres sites.

Présence de larves de moules au stade *grosses* en quantité élevée au Courbey, en quantités modérées à Arguin et au Ferret et en quantités faibles sur les deux autres points.

Prochains prélèvements de larves de moules le 05 mai 2026.

Marion BÉCHADE – m.bechade@cape-na.fr
 CAPENA – Expertise et Application

05 57 73 08 45 / 06 81 98 30 72 – <https://www.cape-na.fr/>




Prélèvements du 6 mai 2026
 PM = 8h46 – coefficient 62

Lieu de prélèvement	Température de l'eau -1m (°C)	Salinité -1m (‰)	Quantité de larves / 1,5m ³		
			Stades		
			Petites (<0,11mm)	Moyennes (0,11 à 0,2mm)	Grosses (>0,2mm)
Arguin	16,1	34,3	1 680 ↗	160 ↘	30 ↘
Ferret	16,5	33,7	6 120 ↗	210 ↘	0 ↘
Courbey	16,6	33,7	6 850 ↗	640 ↘	0 ↘
Piquey	17,8	31,5	9 625 ↗	620 ↗	0 ↘
Humeyre	17,6	31,5	10 680 ↗	1 050 ↗	30 ↘
Moyenne	16,9	32,9	6 991	536	12

Appréciation des quantités de larves en comparaison avec les références par stades larvaires : Abaque basé sur les résultats de l'ensemble des points obtenus depuis 2016 (Arguin et Courbey) et 2018 (Ferret, Piquey, Humeyre) ; Source CAPENA.

Appréciation des quantités de larves


Faible
Modérée
Forte



Références des températures et salinités de l'eau sur le Bassin d'Arcachon – données Ifremer réseau ARCHYD

La **température de l'eau** est supérieure (+ 1.4°C) à la moyenne de référence 2006-2025.

La **salinité** est supérieure (+ 1.5‰) à la moyenne de référence 2006-2025.



Présence de larves de moules au stade *petites* en quantité modérée à Arguin et en quantités élevées sur tous les autres points.

Présence de larves de moules au stade *moyennes* en quantité élevée à la Humeyre, en quantités modérées au Courbey et à Piquey et en faibles quantités sur les deux autres sites.

Présence de larves de moules au stade *grosses* en quantités faibles à Arguin et la Humeyre. Pas d'observation de larves à ce stade sur les autres points.

Prochains prélèvements de larves de moules le 11 mai 2026.

Marion BÉCHADE – m.bechade@cape-na.fr
 CAPENA – Expertise et Application

05 57 73 08 45 / 06 81 98 30 72 – <https://www.cape-na.fr/>




Prélèvements du 11 mai 2026
PM = 13h44 – coefficient 40

Lieu de prélèvement	Température de l'eau -1m (°C)	Salinité -1m (‰)	Quantité de larves / 1,5m ³		
			Stades		
			Petites (<0,11mm)	Moyennes (0,11 à 0,2mm)	Grosses (>0,2mm)
Arguin	18,4	32,5	1 670	810	0
Ferret	18,3	32,4	2 835	990	0
Courbey	18,4	32,3	6 320	1 520	0
Piquey	19,1	30,7	13 224	241	0
Humeyre	19,5	30,6	10 038	202	0
Moyenne	18,7	31,7	6 817	753	0

Appréciation des quantités de larves en comparaison avec les références par stades larvaires : Abaque basé sur les résultats de l'ensemble des points obtenus depuis 2016 (Arguin et Courbey) et 2018 (Ferret, Piquey, Humeyre) ; Source CAPENA.

Appréciation des quantités de larves


Faible
Modérée
Forte



Références des températures et salinités de l'eau sur le Bassin d'Arcachon – données Ifremer réseau ARCHYD

La **température de l'eau** est largement supérieure (+ 2.7°C) à la moyenne de référence 2006-2025.

La **salinité** est équivalente (+ 0.1‰) à la moyenne de référence 2006-2025.



Présence de larves de moules au stade *petites* en quantités élevées au Courbey, à Piquey et la Humeyre, et en quantités modérées sur les deux autres points.

Présence de larves de moules au stade *moyennes* en quantité élevée au Courbey, en quantités modérées à Arguin et au Ferret et en faibles quantités sur les deux autres sites.

Pas d'observation de larves de moules au stade *grosses* sur l'ensemble des points.

Prochains prélèvements de larves de moules le 19 mai 2026.

Marion BÉCHADE – m.bechade@cape-na.fr
CAPENA – Expertise et Application

05 57 73 08 45 / 06 81 98 30 72 – <https://www.cape-na.fr/>




Prélèvements du 19 mai 2026
 PM = 08h02 – coefficient 95

Lieu de prélèvement	Température de l'eau -1m (°C)	Salinité -1m (‰)	Quantité de larves / 1,5m ³		
			Stades		
			Petites (<0,11mm)	Moyennes (0,11 à 0,2mm)	Grosses (>0,2mm)
Arguin	16,6	34,1	390	120	0
Ferret	16,5	34,1	350	105	0
Courbey	16,5	34,0	270	205	0
Piquey	16,9	31,4	270	100	0
Humeyre	16,9	31,2	240	85	0
Moyenne	16,7	33,0	304	123	0

Appréciation des quantités de larves en comparaison avec les références par stades larvaires : Abaque basé sur les résultats de l'ensemble des points obtenus depuis 2016 (Arguin et Courbey) et 2018 (Ferret, Piquey, Humeyre) ; Source CAPENA.

Appréciation des quantités de larves


Faible
Modérée
Forte



Références des températures et salinités de l'eau sur le Bassin d'Arcachon – données Ifremer réseau ARCHYD

La **température de l'eau** est équivalente (- 0.08°C) à la moyenne de référence 2006-2025.

La **salinité** est supérieure (+ 1.2‰) à la moyenne de référence 2006-2025.



Présence de larves de moules au stade *petites* en faibles quantités sur l'ensemble des points.

Présence de larves de moules au stade *moyennes* en faibles quantités sur l'ensemble des sites.

Pas d'observation de larves de moules au stade *grosses* sur l'ensemble des points.

Prochains prélèvements de larves de moules le 26 mai 2026.

Marion BÉCHADE – m.bechade@cape-na.fr
 CAPENA – Expertise et Application

05 57 73 08 45 / 06 81 98 30 72 – <https://www.cape-na.fr/>





Prélèvements du 26 mai 2026
PM = 15h10 – coefficient 55

Lieu de prélèvement	Température de l'eau -1m (°C)	Salinité -1m (‰)	Quantité de larves / 1,5m ³		
			Stades		
			Petites (<0,11mm)	Moyennes (0,11 à 0,2mm)	Grosses (>0,2mm)
Arguin	19,7	33,9	70 ↘	260 ↗	0 →
Ferret	20,3	33,3	1 085 ↗	695 ↗	0 →
Courbey	22,2	32,5	3 425 ↗	1 055 ↗	0 →
Piquey	23,8	30,8	6 685 ↗	140 ↗	0 →
Humeyre	24,1	30,8	5 390 ↗	0 ↘	0 →
Moyenne	22,0	32,3	3 331	430	0

Appréciation des quantités de larves en comparaison avec les références par stades larvaires : Abaque basé sur les résultats de l'ensemble des points obtenus depuis 2016 (Arguin et Courbey) et 2018 (Ferret, Piquey, Humeyre) ; Source CAPENA.

Appréciation des quantités de larves

Faible
Modérée
Forte



Références des températures et salinités de l'eau sur le Bassin d'Arcachon – données Ifremer réseau ARCHYD

La **température de l'eau** est très largement supérieure (+ 4.6°C) à la moyenne de référence 2006-2025.

La **salinité** est légèrement supérieure (+ 0.3‰) à la moyenne de référence 2006-2025.

Présence de larves de moules au stade *petites* en quantités élevées au Courbey, à Piquey et la Humeyre, en quantité modérée au Ferret et en faible quantité à Arguin.

Présence de larves de moules au stade *moyennes* en quantité élevée au Courbey, modérée au Ferret et en faibles quantités à Arguin et Piquey. Pas d'observation de larves à ce stade à la Humeyre.

Pas d'observation de larves de moules au stade *grosses* sur l'ensemble des points.

Prochains prélèvements de larves de moules le 3 juin 2026.

Marion BÉCHADE – m.bechade@cape-na.fr
CAPENA – Expertise et Application

05 57 73 08 45 / 06 81 98 30 72 – <https://www.cape-na.fr/>



Prélèvements du 3 juin 2026

PM = 08h00 – coefficient 68


Lieu de prélèvement	Température de l'eau -1m (°C)	Salinité -1m (‰)	Quantité de larves / 1,5m ³			
			Stades			
			Petites (<0,11mm)	Moyennes (0,11 à 0,2mm)	Grosses (>0,2mm)	
Arguin	19,5	33,9	455	70	0	
Ferret	20,2	33,7	385	170	0	
Courbey	20,1	33,6	875	335	0	
Piquey	21,8	31,9	420	140	0	
Humeyre	21,7	31,8	385	135	0	
Moyenne	20,7	33,0	504	170	0	

Appréciation des quantités de larves en comparaison avec les références par stades larvaires : Abaque basé sur les résultats de l'ensemble des points obtenus depuis 2016 (Arguin et Courbey) et 2018 (Ferret, Piquey, Humeyre) ; Source CAPENA.


Appréciation des quantités de larves

Faible
Modérée
Forte

Evolution de la température et de la salinité de l'eau à -1m



Evolution des cohortes de larves de moules en 2026



Références des températures et salinités de l'eau sur le Bassin d'Arcachon – données Ifremer réseau ARCHYD

La **température de l'eau** est largement supérieure (+ 2.4°C) à la moyenne de référence 2006-2025.

La **salinité** est supérieure (+ 0.9‰) à la moyenne de référence 2006-2025.

Présence de larves de moules au stade *petites* en faibles quantités sur l'ensemble des points.

Présence de larves de moules au stade *moyennes* en quantité modérée au Courbey et en faibles quantités sur les autres sites.

Pas d'observation de larves de moules au stade *grosses* sur l'ensemble des points.

Prochains prélèvements de larves de moules le 10 juin 2026.

Marion BÉCHADE – m.bechade@cape-na.fr
CAPENA – Expertise et Application

05 57 73 08 45 / 06 81 98 30 72 – <https://www.cape-na.fr/>




Prélèvements du 11 juin 2026
PM = 14h58 – coefficient 60

Lieu de prélèvement	Température de l'eau -1m (°C)	Salinité -1m (‰)	Quantité de larves / 1,5m ³		
			Stades		
			Petites (<0,11mm)	Moyennes (0,11 à 0,2mm)	Grosses (>0,2mm)
Arguin	19,3	34,3	35	65	0
Ferret	19,7	33,9	90	120	25
Courbey	20,3	33,7	35	35	0
Piquey	21,7	32,0	140	130	0
Humeyre	22,0	31,7	0	0	0
Moyenne	20,6	33,1	60	70	5

Appréciation des quantités de larves en comparaison avec les références par stades larvaires : Abaque basé sur les résultats de l'ensemble des points obtenus depuis 2016 (Arguin et Courbey) et 2018 (Ferret, Piquey, Humeyre) ; Source CAPENA.

Appréciation des quantités de larves


Faible
Modérée
Forte



Références des températures et salinités de l'eau sur le Bassin d'Arcachon – données Ifremer réseau ARCHYD

La **température de l'eau** est très supérieure (+ 1.5°C) à la moyenne de référence 2006-2025.

La **salinité** est supérieure (+ 0.8‰) à la moyenne de référence 2006-2025.



Présence de larves de moules au stade *petites* en faibles quantités sur l'ensemble des points, sauf à la Humeyre où aucune larve n'a été observée.

Présence de larves de moules au stade *moyennes* en faibles quantités sur l'ensemble des points, sauf à la Humeyre où aucune larve n'a été observée.

Présence de larves de moules au stade *grosses* en faible quantité au Ferret. Pas d'observation de larve à ce stade sur les autres points.

Prochains prélèvements de larves de moules le 18 juin 2026.

Marion BÉCHADE – m.bechade@cape-na.fr
CAPENA – Expertise et Application

05 57 73 08 45 / 06 81 98 30 72 – <https://www.cape-na.fr/>



Prélèvements du 18 juin 2026


PM = 08h47 – coefficient 90

Lieu de prélèvement	Température de l'eau -1m (°C)	Salinité -1m (‰)	Quantité de larves / 1,5m ³		
			Stades		
			Petites (<0,11mm)	Moyennes (0,11 à 0,2mm)	Grosses (>0,2mm)
Arguin	19,5	34,5	60 ↗	30 ↘	30 ↗
Ferret	20,5	34,0	60 ↘	30 ↘	0 ↘
Courbey	20,0	34,2	30 ↘	0 ↘	0 ↗
Piquey	22,8	32,6	0 ↘	85 ↘	50 ↗
Humeyre	22,6	32,8	30 ↗	60 ↗	0 ↗
Moyenne	21,1	33,6	36	41	16

Appréciation des quantités de larves en comparaison avec les références par stades larvaires : Abaque basé sur les résultats de l'ensemble des points obtenus depuis 2016 (Arguin et Courbey) et 2018 (Ferret, Piquey, Humeyre) ; Source CAPENA.

Appréciation des quantités de larves


Faible
Modérée
Forte



Références des températures et salinités de l'eau sur le Bassin d'Arcachon – données Ifremer réseau ARCHYD

La **température de l'eau** est supérieure (+ 1.2°C) à la moyenne de référence 2006-2025.

La **salinité** est supérieure (+ 1.1‰) à la moyenne de référence 2006-2025.



Présence de larves de moules au stade *petites* en faibles quantités sur l'ensemble des points, sauf à Piquey où aucune larve n'a été observée.

Présence de larves de moules au stade *moyennes* en faibles quantités sur l'ensemble des points, sauf au Courbey où aucune larve n'a été observée.

Présence de larves de moules au stade *grosses* en quantité modérée à Piquey et en faible quantité à Arguin. Pas d'observation de larve à ce stade sur les trois autres points.

Prochains prélèvements de larves de moules le 25 juin 2026.

Marion BÉCHADE – m.bechade@cape-na.fr
CAPENA – Expertise et Application

05 57 73 08 45 / 06 81 98 30 72 – <https://www.cape-na.fr/>





Prélèvements du 25 juin 2026
PM = 15h15 – coefficient 47

Lieu de prélèvement	Température de l'eau -1m (°C)	Salinité -1m (‰)	Quantité de larves / 1,5m ³		
			Stades		
			Petites (<0,11mm)	Moyennes (0,11 à 0,2mm)	Grosses (>0,2mm)
Arguin	22,0	34,4	0	60	30
Ferret	23,0	34,2	0	40	30
Courbey	25,7	33,5	240	200	0
Piquey	28,7	32,5	120	35	0
Humeyre	28,3	32,7	160	40	30
Moyenne	25,5	33,5	104	75	18

Appréciation des quantités de larves en comparaison avec les références par stades larvaires : Abaque basé sur les résultats de l'ensemble des points obtenus depuis 2016 (Arguin et Courbey) et 2018 (Ferret, Piquey, Humeyre) ; Source CAPENA.

Appréciation des quantités de larves

Faible
Modérée
Forte



Références des températures et salinités de l'eau sur le Bassin d'Arcachon – données Ifremer réseau ARCHYD

La **température de l'eau** est exceptionnellement supérieure (+ 4.9°C) à la moyenne de référence 2006-2025.

La **salinité** est supérieure (+ 0.8‰) à la moyenne de référence 2006-2025.

Présence de larves de moules au stade *petites* en faibles quantités au Courbey, à Piquey et la Humeyre. Pas d'observation de larve à ce stade sur les deux autres points.

Présence de larves de moules au stade *moyennes* en faibles quantités sur l'ensemble des points.

Présence de larves de moules au stade *grosses* en faibles quantités à Arguin, au Ferret et la Humeyre. Pas d'observation de larve à ce stade sur les deux autres points.

Prochains prélèvements de larves de moules le 2 juillet 2026.

Marion BÉCHADE – m.bechade@cape-na.fr
CAPENA – Expertise et Application

05 57 73 08 45 / 06 81 98 30 72 – <https://www.cape-na.fr/>



Prélèvements du 2 juillet 2026
 PM = 07h47 – coefficient 71


Lieu de prélèvement	Température de l'eau -1m (°C)	Salinité -1m (‰)	Quantité de larves / 1,5m ³		
			Stades		
			Petites (<0,11mm)	Moyennes (0,11 à 0,2mm)	Grosses (>0,2mm)
Arguin	18,4	34,9	120 ↗	230 ↗	210 ↗
Ferret	22,8	33,8	35 ↗	30 ↘	30 ↗
Courbey	20,3	34,4	50 ↘	50 ↘	0 ↗
Piquey	22,5	34,0	0 ↘	40 ↗	0 ↗
Humeyre	25,2	32,5	0 ↘	35 ↘	0 ↘
Moyenne	21,8	33,9	41	77	48

Appréciation des quantités de larves en comparaison avec les références par stades larvaires : Abaque basé sur les résultats de l'ensemble des points obtenus depuis 2016 (Arguin et Courbey) et 2018 (Ferret, Piquey, Humeyre) ; Source CAPENA.

Appréciation des quantités de larves

Faible
Modérée
Forte

Evolution de la température et de la salinité de l'eau à -1m




Références des températures et salinités de l'eau sur le Bassin d'Arcachon – données Ifremer réseau ARCHYD

La **température de l'eau** est légèrement supérieure (+ 0.4°C) à la moyenne de référence 2006-2025.

La **salinité** est supérieure (+ 1.1‰) à la moyenne de référence 2006-2025.

Evolution des cohortes de larves de moules en 2026



Présence de larves de moules au stade *petites* en faibles quantités à Arguin, au Ferret et au Courbey. Pas d'observation de larve à ce stade sur les deux autres points.

Présence de larves de moules au stade *moyennes* en faibles quantités sur l'ensemble des points.

Présence de larves de moules au stade *grosses* en quantité élevée à Arguin et en faible quantité au Ferret. Pas d'observation de larve à ce stade sur les autres sites.

Prochains et derniers prélèvements de larves de moules le 9 juillet 2026.

Marion BÉCHADE – m.bechade@cape-na.fr
 CAPENA – Expertise et Application

05 57 73 08 45 / 06 81 98 30 72 – <https://www.cape-na.fr/>




Prélèvements du 9 juillet 2026
 PM = 13h06 – coefficient 52

Lieu de prélèvement	Température de l'eau -1m (°C)	Salinité -1m (‰)	Quantité de larves / 1,5m ³		
			Stades		
			Petites (<0,11mm)	Moyennes (0,11 à 0,2mm)	Grosses (>0,2mm)
Arguin	22,0	34,5	280 ↗	70 ↘	0 ↘
Ferret	21,2	34,5	35 →	0 ↘	30 →
Courbey	24,0	33,9	50 →	0 ↘	0 →
Piquey	25,3	33,6	120 ↗	0 ↘	0 →
Humeyre	24,0	33,9	160 ↗	0 ↘	0 →
Moyenne	23,3	34,1	129	14	6

Appréciation des quantités de larves en comparaison avec les références par stades larvaires : Abaque basé sur les résultats de l'ensemble des points obtenus depuis 2016 (Arguin et Courbey) et 2018 (Ferret, Piquey, Humeyre) ; Source CAPENA.

Appréciation des quantités de larves


Faible
Modérée
Forte



Références des températures et salinités de l'eau sur le Bassin d'Arcachon – données Ifremer réseau ARCHYD

La **température de l'eau** est supérieure (+ 1.1°C) à la moyenne de référence 2006-2025.

La **salinité** est supérieure (+ 1.0‰) à la moyenne de référence 2006-2025.



Présence de larves de moules au stade *petites* en faibles quantités sur l'ensemble des points.

Présence de larves de moules au stade *moyennes* en faible quantité à Arguin. Pas d'observation de larves à ce stade sur les autres points.

Présence de larves de moules au stade *grosses* en faible quantité au Ferret. Pas d'observation de larve à ce stade sur les autres sites.

Derniers prélèvements de larves de moules de la saison 2026.

Marion BÉCHADE – m.bechade@cape-na.fr
 CAPENA – Expertise et Application

05 57 73 08 45 / 06 81 98 30 72 – <https://www.cape-na.fr/>



Marion Béchade

Chargée de mission – Aquaculture et Environnement
m.bechade@cape-na.fr

CAPENA – Expertise et Application

15 rue de la Barbotière – 33470 Gujan-Mestras
05 57 73 08 45 / 06 81 98 30 72
<https://www.cape-na.fr/>



RÉGION
Nouvelle-Aquitaine

