



				Quantités de larves pour 1,5 m ³			
06/08/2026	Lieu de prélèvement	Température -1m (°C)	Salinité* -1m (‰)	Petites	Petites évoluées	Moyennes	Grosses
Seudre	Coux	23,5	34,9	780	0	0	0
Centre du Bassin	Mérignac	21,4	34,1	60	30	0	0
Charente	La Moulière	21,8	34,3	0	0	0	0
	Fouras	22,6	34,8	60	270	0	0
Nord Charente	Ré Ste Marie	21,4	33,9	160	150	0	0
	Ré Loix	21,4	33,4	0	120	30	0
	Digolet (Marsilly)	23,6	34,9	120	0	60	30
Moyenne		22,2	34,3	169	81	13	4

* Salinité de référence de l'eau de mer, Océan Atlantique = 35‰.


Les flèches ↗ ↘ ↔ : évolution depuis le prélèvement précédent.

Appréciation des quantités de larves

Faible Moyenne Forte

Évolution de la température et de la salinité de l'eau

Temp. °C et Salinité ‰



Évolution de la température de l'eau (°C) et de la salinité (mg/l, ou ‰) comparées aux références : moyenne de 2005 à 2025 (source : suivi des larves, Creaa / CAPENA).

La salinité moyenne (34,3‰) est supérieure de +1,1‰ à la normale de saison.

La température moyenne de l'eau est de 22,2°C, supérieure à la normale de saison de +0,4°C.

Commentaires : Les stades larvaires

Seudre : Coux

- ⇒ Faible quantité de larves au stade Petites ;

Centre du bassin : Mérignac

- ⇒ Faibles quantités de Petites et Petites évoluées ;

Embouchure de La Charente

⇒ Moulière

- Aucune larves observée ;

⇒ Fouras :

- Faibles quantités de Petites et Petites évoluées ;

Nord Charente

⇒ Sainte-Marie.





- Faibles quantités de Petites et Petites évoluées ;

⇒ Loix

- Faibles quantités de Petites évoluées et Moyennes ;

⇒ Digolet

- Faibles quantités de Petites, Moyennes et Grosses.



Bouquet Anne Lise – al.bouquet@cape-na.fr
CAPENA – Expertise et Application
05 46 47 49 52 – <https://www.cape-na.fr>

Prochains prélèvements le 10 Août 2026.

Données sur <https://www.cape-na.fr>

et sur le site Velyger
<https://velyger.ifremer.fr/Access-aux-donnees2>

Ainsi que sur le site du CRC 17.