



				Quantités de larves pour 1,5 m ³			
10/08/2026	Lieu de prélèvement	Température -1m (°C)	Salinité * -1m (‰)	Petites	Petites évoluées	Moyennes	Grosses
Seudre	Coux	23,4	34,4	180 ↗	0 ⇒	0 ⇒	0 ⇒
Centre du Bassin	Mérignac	22,3	34,1	270 ↗	0 ↘	0 ⇒	0 ⇒
Charente	La Moulière	23,1	34,1	30 ↗	0 ⇒	0 ⇒	0 ⇒
	Fouras	23,6	35,0	90 ↗	90 ↘	60 ↗	0 ⇒
Nord Charente	Ré Ste Marie	22,2	34,0	180 ↗	30 ↘	30 ↗	30 ↗
	Ré Loix	21,4	34,0	0 ⇒	0 ↘	0 ↘	30 ↗
	Digolet (Marsilly)	23,4	34,7	0 ↘	0 ⇒	0 ↘	30 ⇒
Moyenne		22,8	34,3	107	0	0	0


* Salinité de référence de l'eau de mer, Océan Atlantique = 35‰.

Les flèches ↗↘⇒ : évolution depuis le prélèvement précédent.
Appréciation des quantités de larves

Faible Moyenne Forte

Évolution de la température et de la salinité de l'eau

Temp. °C et Salinité ‰



Évolution de la température de l'eau (°C) et de la salinité (mg/l, ou ‰) comparées aux références : moyenne de 2005 à 2025 (source : suivi des larves, Creaa / CAPENA).

La salinité moyenne est stable (34,3‰), proche de la normale de saison.

La température moyenne de l'eau est de 22,8°C, supérieure à la normale de saison de +1,9°C.

Commentaires : Les stades larvaires

Seudre : Coux

- ⇒ Faible quantité de larves au stade Petites ;

Centre du bassin : Mérignac


- ⇒ Faible quantité de larves au stade Petites ;

Embouchure de La Charente

- Moulière
 - Faible quantité de larves au stade Petites ;
- ⇒ Fouras :
 - Faibles quantités de Petites, Petites évoluées et Moyennes ;

Nord Charente

- ⇒ Sainte-Marie
 - Faibles quantités aux 4 stades : Petites, Petites évoluées, Moyennes et Grosses ;
- ⇒ Loix
 - Faible quantité de Grosses ;
- ⇒ Digolet
 - Faible quantité de Grosses.



Bouquet Anne Lise – al.bouquet@cape-na.fr
 CAPENA – Expertise et Application
 05 46 47 49 52 – <https://www.cape-na.fr>

Prochains prélèvements le 13 Août 2026.

Données sur <https://www.cape-na.fr>

et sur le site Velyger
<https://velyger.ifremer.fr/Access-aux-donnees2>

Ainsi que sur le site du CRC 17.