



				Quantités de larves pour 1,5 m ³			
27/08/2026	Lieu de prélèvement	Température -1m (°C)	Salinité* -1m (‰)	Petites	Petites évoluées	Moyennes	Grosses
	Seudre						
	Coux	23,0	34,6	690 ↗	0 ⇨	0 ⇨	0 ⇨
	Centre du Bassin						
	Mérignac	21,9	34,1	30 ⇨	0 ⇨	0 ⇨	0 ⇨
	Charente						
	La Moulière	23,3	32,2	1 360 ↗	0 ⇨	0 ⇨	0 ⇨
	Fouras	22,8	34,4	500 ⇨	100 ⇨	0 ⇨	0 ⇨
	Nord Charente						
	Ré Ste Marie	21,0	34,1	1 080 ⇨	120 ⇨	0 ⇨	0 ⇨
	Ré Loix	22,0	34,3	1 900 ↗	0 ⇨	0 ⇨	0 ⇨
	Digolet (Marsilly)	22,6	34,7	420 ⇨	240 ↗	0 ⇨	0 ⇨
	Moyenne	22,4	34,1	854	66	0	0

* Salinité de référence de l'eau de mer, Océan Atlantique = 35‰.


Les flèches ↗⇨⇨ : évolution depuis le prélèvement précédent.

Appréciation des quantités de larves

Faible Moyenne Forte

Évolution de la température et de la salinité de l'eau

Temp. °C et Salinité ‰



Évolution de la température de l'eau (°C) et de la salinité (mg/l, ou ‰) comparées aux références : moyenne de 2005 à 2025 (source : suivi des larves, Creaa / CAPENA).

La salinité moyenne (34,1‰) est supérieure de +0,4‰ à la normale de saison.

La température moyenne de l'eau est de 22,4°C, supérieure à la normale de saison de +1,2°C.

Commentaires : Les stades larvaires

Seudre : Coux

⇨ Faible quantité de Petites ;

Centre du bassin : Mérignac

⇨ Faible quantité de Petites ;

Embouchure de La Charente

⇨ Moulière

○ Faible quantité de Petites ;

⇨ Fouras ;

○ Faibles quantités de Petites et Petites évoluées ;

Nord Charente

⇨ Sainte-Marie,





○ Faibles quantités de Petites et Petites évoluées ;

⇨ Loix

○ Faible quantité de Petites ;

⇨ Digolet

○ Faibles quantités de Petites et Petites évoluées.



Bouquet Anne Lise – al.bouquet@cape-na.fr
 CAPENA – Expertise et Application
 05 46 47 49 52 – <https://www.cape-na.fr>

Prochains prélèvements le 01 Septembre 2026.

Données sur <https://www.cape-na.fr>

et sur le site Velyger
<https://velyger.ifremer.fr/Access-aux-donnees2>

Ainsi que sur le site du CRC 17.