



				Quantités de larves pour 1,5 m ³			
14/09/2026	Lieu de prélèvement	Température -1m (°C)	Salinité* -1m (‰)	Petites	Petites évoluées	Moyennes	Grosses
Seudre	Coux	21,5	34,3	30 ↗	0 ⇒	0 ⇒	0 ⇒
Centre du Bassin	Mérignac	21,2	34,2	30 ↗	30 ↗	0 ⇒	0 ⇒
Charente	La Mouclière	21,5	34,6	0 ↘	0 ↘	0 ↘	0 ⇒
	Fouras	21,8	34,8	0 ↘	180 ↗	0 ⇒	30 ↗
Nord Charente	Ré Ste Marie	Fin du suivi sur le nord du littoral charentais le 3 septembre 2026.					
	Ré Loix						
	Digolet (Marsilly)						
Moyenne		21,5	34,5	15	53	0	8

* Salinité de référence de l'eau de mer, Océan Atlantique = 35‰.


Les flèches ↗↘⇒ : évolution depuis le prélèvement précédent.

Appréciation des quantités de larves

Faible Moyenne Forte

Évolution de la température et de la salinité de l'eau

Temp. °C et Salinité ‰



Évolution de la température de l'eau (°C) et de la salinité (mg/l, ou ‰) comparées aux références : moyenne de 2005 à 2025 (source : suivi des larves, Creaa / CAPENA).





La salinité moyenne est stable, proche de la normale de saison avec 34,5‰.

La température moyenne de l'eau (21,5°C) est +1,6°C au-dessus de la normale de saison.

Commentaires : Les stades larvaires

- **Seudre : Coux**
⇒ Faible quantité de Petites ;
- **Centre du bassin : Mérignac**
⇒ Faibles quantités de Petites et Petites évoluées ;
- **Embouchure de La Charente**
⇒ Mouclière
○ Aucune larve observée ;
⇒ Fouras :
○ Faibles quantités de Petites évoluées et de Grosses ;
- **Nord Charente**
⇒ Sainte-Marie, Loix et Digolet

Le suivi est terminé sur ce secteur depuis le 3 septembre.



Bouquet Anne Lise – al.bouquet@cape-na.fr
CAPENA – Expertise et Application
05 46 47 49 52 – <https://www.cape-na.fr>

Fin du suivi 2026.

Données sur <https://www.cape-na.fr>

et sur le site Velyger
<https://velyger.ifremer.fr/Access-aux-donnees2>

Ainsi que sur le site du CRC 17.