



Prélèvements du 31 août 2026
 BM = 14h19


	Lieu de prélèvement	Température de l'eau -1m (°C)	Salinité -1m (‰)	Quantité de larves / 1,5m ³			
				Stades			
				Petites	Petites évoluées	Moyennes	Grosses
Secteur Est	Arams	23,4	33,4	45 ↗	0 →	0 →	0 →
	Gujan	23,7	32,8	0 →	0 →	0 →	0 →
	Comprian	23,4	32,8	90 ↗	0 →	0 →	0 →
Secteur Ouest	Courbey	23,4	34,5	560 ↗	0 ↘	0 →	40 ↗
	Piquey	23,5	34,2	875 ↗	35 ↗	0 →	0 →
	Arès	23,5	34,2	850 ↗	0 →	0 →	0 →
	Arguin	23,3	34,7	1 155 ↗	95 ↘	0 →	0 →
Moyenne		23,5	33,8	511	19	0	6

Appréciation des quantités de larves en comparaison avec les références par stades larvaires : Abaque basé sur les résultats obtenus depuis 1993 ; Sources Ifremer et CAPENA.


Appréciation des quantités de larves

Faible
Modérée
Forte

Evolution de la température et de la salinité de l'eau à -1m



Evolution des cohortes de larves d'huîtres en 2026



Références des températures et salinités de l'eau sur le Bassin d'Arcachon – données Ifremer réseau ARCHYD

La **température de l'eau** est très supérieure (+1,9°C) à la moyenne de référence 2006-2025.

La **salinité** est équivalente (-0,05‰) à la moyenne de référence 2006-2024.

Secteur Est : Présence de larves au stade *petites* en faibles quantités à Arams et Comprian, aucune observation à Gujan. Aucune observation de larve aux stades *petites évoluées*, *moyennes* et *grosses* sur l'ensemble des points de ce secteur.

Secteur Ouest : Quantités faibles de larves au stade *petites* sur l'ensemble des points. Quantités faibles de larves au stade *petites évoluées* à Piquey et Arguin, pas d'observation sur les autres sites. Pas d'observation de larves au stade *moyennes* sur l'ensemble des points. Présence de larve au stade *grosses* en faible quantité au Courbey, pas d'observation sur les autres sites.

Prochains prélèvements de larves d'huîtres le 3 septembre 2026.

Marion Béchade – m.bechade@cape-na.fr
 CAPENA – Expertise et Application

05 57 73 08 45 / 06 81 98 30 72 – <https://www.cape-na.fr/>