



Prélèvements du 14 septembre 2026
 BM = 14h18


	Lieu de prélèvement	Température de l'eau -1m (°C)	Salinité -1m (‰)	Quantité de larves / 1,5m ³			
				Stades			
				Petites	Petites évoluées	Moyennes	Grosses
Secteur Est	Arams	22,0	33,9	0 ⇒	30 ↗	0 ⇒	0 ⇒
	Gujan	23,0	33,3	0 ⇒	0 ⇒	0 ⇒	30 ↗
	Comprian	22,5	33,3	0 ⇒	35 ↗	0 ⇒	35 ↗
Secteur Ouest	Courbey	20,6	34,7	0 ⇒	0 ⇒	0 ⇒	30 ↗
	Piquey	21,5	34,5	0 ⇒	0 ⇒	0 ⇒	0 ⇒
	Arès	21,7	34,5	0 ⇒	0 ⇒	0 ⇒	0 ⇒
	Arguin	20,1	34,9	0 ⇒	0 ↘	0 ⇒	0 ↘
Moyenne		21,6	34,2	0	9	0	14

Appréciation des quantités de larves en comparaison avec les références par stades larvaires : Abaque basé sur les résultats obtenus depuis 1993 ; Sources Ifremer et CAPENA.

Appréciation des quantités de larves

Faible
Modérée
Forte

Evolution de la température et de la salinité de l'eau à -1m




Références des températures et salinités de l'eau sur le Bassin d'Arcachon – données Ifremer réseau ARCHYD

La **température de l'eau** est supérieure (+1,1°C) à la moyenne de référence 2006-2025.

La **salinité** est légèrement supérieure (+0,2‰) à la moyenne de référence 2006-2024.

Evolution des cohortes de larves d'huîtres en 2026



Secteur Est : Aucune observation de larve aux stades *petites* et *moyennes* sur l'ensemble des points de ce secteur. Présence de larves en faibles quantités au stade *petites évoluées* à Arams et Comprian, pas d'observation à Gujan. Quantités faibles de larves au stade *grosses* à Gujan et Comprian, aucune observation à Arams.

Secteur Ouest : Aucune observation de larve aux stades *petites*, *petites évoluées* et *moyennes* sur l'ensemble des points de ce secteur. Présence de larves en faible quantité au stade *grosses* au Courbey, pas d'observation sur les autres sites.

Derniers prélèvements de larves d'huîtres de la saison 2026.

Marion Béchade – m.bechade@cape-na.fr
 CAPENA – Expertise et Application

05 57 73 08 45 / 06 81 98 30 72 – <https://www.cape-na.fr/>