

Créé en 2016, l'Observatoire Ostréicole suit des lots d'huîtres naturelles sur **6 parcs du Bassin d'Arcachon** dans des conditions d'élevage représentatives des pratiques professionnelles locales. Captés sur coupelles par CAPENA sur le site de Maoureuou, les lots sont placés sur parcs en mars de chaque année (2026 : semaine 12) et élevés pendant 3 ans. Un suivi saisonnier de la **mortalité** et de la **croissance** (gain de poids), ainsi qu'un bilan annuel (fin d'année) sont réalisés sur les lots des trois classes d'âge.

Les résultats ci-dessous représentent l'état des performances des lots à la **fin de l'été 2026** et sont issus des derniers échantillonnages réalisés **le 29/09/2026**.

Tableau 1 : Taux de mortalité (%) ; moyenne) et croissance pondérale (g ; moyenne) des lots d'huîtres de 1^{ère}, 2nd et 3^{ème} année, obtenus à la fin de l'été 2026 (valeurs en gras). Les valeurs de référence correspondent à la moyenne de 9 années de suivi (2017-2025) pour les huîtres des trois classes d'âge. Les flèches représentent l'évolution des tendances actuelles par rapport aux valeurs référence à la même période.

	Mortalité		Croissance	
<u>1^{ère} année</u>	75,3 % (Référence : 51,7 %)	↗	+14,4 g (Référence : +13,9 g) Poids individuel = 15,0 g	⇒
<u>2^{ème} année</u>	35,1 % (Référence : 18,3 %)	↗	+22,4 g (Référence : +20,9 g) Poids individuel = 45,9 g	↗
<u>3^{ème} année</u>	16,4 % (Référence : 12,6 %)	↗	+19,8 g (Référence : +17,9 g) Poids individuel = 68,8 g	↗

I. Mortalité

A l'issue de l'été 2026, les **mortalités** observées sont, comme les années précédentes, toujours **importantes**.

Les lots de **naissains** ont connu des **mortalités printanières et estivales importantes (75,3 % au total)**, similaires à celles observées en 2024. Les moyennes observées sont supérieures aux références sur l'ensemble des sites. Elles sont comprises entre **58,6 % à Grand Banc** et **91,6 % aux Jalles**. Malgré une moyenne élevée, le site de **Grand Banc** se démarque des autres par une survie plus importante. L'ensemble des autres zones montrent des pertes supérieures à 70 %, soit plus de deux tiers du cheptel mis à l'eau en mars 2026.

Pour les huîtres de **deuxième année d'élevage**, le site **Jalles** présente la mortalité moyenne la plus élevée (**50,4 %**). Il se démarque de l'ensemble des autres secteurs, tous très similaires en termes de mortalité moyenne observée. En effet, les cinq autres sites présentent des valeurs comprises entre **30 % à Grand Banc** et **34,8 % au Pelourdey**. Ces moyennes sont pour autant très élevées pour la saison et largement supérieures aux différentes références. Finalement,

la moyenne de mortalité observée sur le Bassin d'Arcachon pour cette classe d'âge (**35,1 %**) est très supérieure à la référence saisonnière du bassin (18,3 %).

Les huîtres en **3^{ème} année d'élevage** ont quant à elles subi des pertes plus « acceptables » (**16,4 %**), mais avec une valeur tout de même supérieure à la référence saisonnière (12,6 %). **Grand Banc** (**25,6 %**) et **Arguin** (**22,8 %**) sont les plus touchés à l'inverse des **Jalles** et des **Grahudes**, moins impactés qu'à leur habitude (respectivement **9,4 %** et **11,7 %** de mortalité).

II. Croissance

Les **croissances** observées en fin d'été 2026 sont **modérées à élevées** pour les trois classes d'âge d'huîtres en élevage.

A l'échelle du bassin, les **naissains** ont obtenu des prises de poids similaires à la moyenne saisonnière (**+14,4 g** ; référence estivale : +13,9 g). Les sites d'**Arguin** (**+18,5 g**), **Bélisaire** (**+12,2 g**) et **Grahudes** (**+14,2 g**) présentent des prises de poids plus importantes qu'à leur habitude à l'inverse des **Jalles** (**+13,7 g**) et de **Pelourdey** (**+15,6 g**), moins performants. Les prises de poids sont comprises entre **+11,9 g** à **Grand Banc** à **+18,5 g** à **Arguin**.

Les huîtres de **2^{ème} année** ont bénéficié d'une croissance élevée (**+22,4 g**), supérieure à la référence (+20,9 g). Les valeurs les plus élevées ont été observées au **Jalles** (**+33,2 g**) et à **Arguin** (**+25,7 g**). Sur cette classe d'âge, les trois sites les plus « océaniques » **Arguin**, **Bélisaire** et **Grand Banc** présentent des résultats proches de leurs moyennes de référence. **Pelourdey** est quant à lui moins performant qu'à son habitude tandis que **Grahudes** et **Jalles** sont plus performants.

Pour les huîtres de **3^{ème} année**, le gain en poids moyen à l'issue de l'été 2026 (**+19,8 g**) est supérieure à la moyenne de référence (+17,9 g). Les plus fortes croissances ont été observées aux **Jalles** (**+27,2 g**) et à **Arguin** (**+23,6 g**). **Bélisaire** (**+17,8 g**) et **Grahudes** (**+19,6 g**) enregistrent également des prises de poids satisfaisantes par rapport à leurs références. A l'inverse, les sites de **Grand Banc** (**+13,4 g**) et **Pelourdey** (**+17,2 g**) sont moins productifs qu'à leur habitude sur cette classe d'âge.

De manière générale, la croissance des huîtres a été élevée mais des mortalités importantes sur les deux plus jeunes classes d'âge d'huîtres sont à déplorer.

Remerciements : Nous remercions les professionnels partenaires qui nous prêtent des emplacements sur leurs parcs et le CRCAA qui héberge notre antenne à Gujan-Mestras.

*Citation : **Vieira J**, Bechade M, Benetiere F (2026) Observatoire Ostréicole du Bassin d'Arcachon – Bulletin saisonnier n°2 – Été 2026. CAPENA, 2p.*