



Créé en 1992, l'Observatoire Ostréicole suit des lots d'huîtres naturelles sur **14 parcs du littoral charentais** (12 dans le Bassin de Marennes-Oléron et 2 sur l'Île de Ré) dans des conditions d'élevage représentatives des pratiques professionnelles locales. Captés sur coupelles par le CAPENA sur le site des Longées, les lots sont placés sur les parcs en mars/avril de chaque année (2026 : semaine 11) et élevés pendant 3 ans. Un suivi saisonnier de la **mortalité** et de la **croissance** (gain de poids), ainsi qu'un bilan annuel (fin d'année) sont réalisés sur les lots des trois classes d'âge.

Les résultats ci-dessous représentent l'état des performances des lots à la **fin de l'été 2026** et sont issus des derniers échantillonnages réalisés le 01/10/2026 dans le **Bassin de Marennes-Oléron** et dans l'**Île de Ré**.

Tableau 1 : Taux de mortalité (%) ; moyenne) et croissance pondérale (g ; moyenne) des lots d'huîtres de 1^{ère}, 2^{ème} et 3^{ème} année obtenus à la fin de l'été 2026 (valeurs en gras). Les valeurs de référence correspondent à la moyenne de 32 années de suivi pour les huîtres de 1^{ère} année (1994-2025) et de 26 années de suivi pour les huîtres de 2^{ème} et 3^{ème} année (2000-2025). Les flèches représentent l'évolution des tendances actuelles par rapport aux valeurs de référence à la même période.

	Mortalité		Croissance	
1^{ère} année sur parcs de demi-élevage	30,4 % (Référence = 53,7 %)	↘	+12,5 g (Référence = +12,3 g) Poids individuel = 13,2 g	⇒
2^{ème} année sur parcs de demi-élevage	11,2 % (Référence = 14,3 %)	↘	+18,5 g (Référence = +19,2 g) Poids individuel = 37,4 g	⇒
3^{ème} année sur parcs de pousse	11,5 % (Référence = 14,9 %)	↘	+24,0 g (Référence = +22,1 g) Poids individuel = 66,6 g	⇒

I. Mortalité

Au mois de septembre 2026, les mortalités des **lots de 1^{ère} année** sont nettement inférieures à la valeur de référence acquise depuis plus de 30 ans (**30,4 % en 2026** contre 53,7 % en référence). Elles sont également très inférieures à celles observées l'année précédente (55,3 % en 2025). Le parc de **Ronce** a été le plus touché pour cette classe d'âge, avec **52 % de pertes**, seul parc dépassant 50 %. Les parcs de **La Mortane (38 %)**, **La Flotte (35 %)**, **Bourgeois (35 %)** et **Viandet (34 %)** enregistrent des mortalités comprises entre 30 et 40 %, soit bien en dessous de leurs niveaux habituels. Les parcs de **Chevalier (27 %)** et **Boyard (25 %)** affichent des valeurs proches de 25 %, tandis que **Martray** et **Mérignac** conservent la meilleure survie pour cette classe, avec respectivement **17 %** et **11 %** de pertes.

Pour les **huîtres de 2^{ème} année**, les mortalités cumulées atteignent **11,2 %**, soit un niveau inférieur à la valeur de référence historique (14,3 %) et à celui observé en 2025 (16,4 %). Le parc le plus affecté est **Bourgeois (26 %)**, nettement au-dessus de sa valeur de référence, suivi

de **La Flotte (16 %)**. Les parcs **Mérignac (14 %)** et **Viandet (10 %)** se situent autour de 10–15 %, tandis que **Ronce (9 %)**, **Chevalier (9 %)**, **La Mortane (8 %)**, **Boyard (6 %)** et **Martray (2 %)** présentent des mortalités relativement faibles en seconde année.

Concernant les **huîtres de 3^{ème} année**, les mortalités cumulées sont en légère hausse par rapport à 2025 (**11,5 % en 2026** contre 9,3 % en 2025) mais restent inférieures à la moyenne de référence (14,9 %). Ces huîtres, déplacées sur les parcs de pousse début juillet, ont obtenues des taux de perte mesurés à la fin de l'été de **6 % à La Casse** et de **14 % à Lamouroux** ou **la Coupe à Colleau**.

II. Croissance

L'été 2026 est caractérisé par des croissances globalement conformes aux valeurs de référence, avec des variations marquées selon les sites.

La croissance des **huîtres de 1^{ère} année** est en moyenne de **+12,5 g** (référence = +12,3 g ; 2025 = +14,6 g). Les parcs les plus performants sont **La Mortane (+21 g)**, **Ronce (+16 g)** et **Viandet (+14 g)**, suivis de **Martray** et **Chevalier (+13 g)**. Les gains les plus faibles ont été mesurés à **Boyard (+6 g)**, **Mérignac (+9 g)** et **La Flotte (+10 g)**. Les huîtres du parc de **Bourgeois** affichent un gain de poids intermédiaire de **+11 g**. Le poids individuel moyen des huîtres de 1^{ère} année est de **13,2 g**, en retrait par rapport à la valeur de 15 g enregistrée l'année précédente.

Les **huîtres de 2^{ème} année** présentent une croissance moyenne de **+18,5 g** (référence = +19,2 g ; 2025 = +19,5 g). Les meilleurs gains sont observés sur **La Mortane (+26 g)**, **Ronce (+24 g)** et **La Flotte (+21 g)**. **Martray** et **Chevalier** affichent respectivement **+20 g** et **+19 g**, tandis que **Bourgeois** et **Viandet** enregistrent **+17 g** et **+16 g**. **Boyard (+13 g)** et surtout **Mérignac (+11 g)** sont les moins performants en seconde année. Le poids individuel moyen atteint **37,4 g** à la fin de l'été.

Enfin, les **huîtres de 3^{ème} année** présentent une croissance moyenne de **+24,0 g**, supérieure à la valeur de référence (+22,1 g) mais en retrait par rapport à 2025 (+27,3 g). Les huîtres des parcs de pousse affichent des gains de **+28 g à La Casse**, **+25 g à la Coupe à Colleau** et **+19 g à Lamouroux**. Le poids individuel moyen de ces lots s'établit à **66,6 g** à la fin de l'été 2026.

Remerciements : Nous remercions les professionnels partenaires, le Lycée Maritime et Aquacole de La Rochelle et le Lycée de la Mer de Bourcefranc qui nous prêtent des emplacements sur leurs parcs. Le Lycée Maritime et Aquacole de La Rochelle entretient les élevages et réalise les échantillonnages sur l'île de Ré.

*Citation : **Barbier P**, Barré M, Bodin P, Oudot G (2026) Observatoire Ostréicole du littoral charentais – Bulletin saisonnier n°2 – Été 2026. CAPENA, 2p.*