Flash Info Mortalités

Bulletin d'information sur les Pertuis Charentais

État sur les mortalités d'huîtres et de moules à la date du 1er octobre 2026

Le Flash Info Mortalités « FIM » *présente aux conchyliculteurs une actualité sur les mortalités des mollusques. Les faits et connaissances communiqués sont validés par l'ensemble des partenaires : CAPENA, CRC-17, Ifremer et DDTM.*

Les résultats ci-dessous présentent les constats des mortalités d'huître creuse et de la moule commune au cours de la fin de l'été 2026. Les données sont issues des réseaux d'observations de CAPENA et de ses partenaires :

- **Observatoire ostréicole du littoral charentais (OBS-17) de CAPENA** : Naissains naturels charentais sur 12 parcs de référence (FIM n°0). Dernier échantillonnage au 30/09/2026.
- **Suivi Interrégional du statut zoosanitaire et des Performances des Naissains (SUZON-17)** : 2 lots de naissains naturels (arcachonnais et charentais), 3 lots 3N et 3 lots 2N mutualisés entre les 4 centres techniques régionaux français. Suivis sur 2 parcs de référence de CAPENA ; Dernier échantillonnage au 09/09/2026.
- **Suivi ECOSCOPA de l'Ifremer** : Naissains NSI *(Naissains Standardisés Ifremer, diploïdes)* sur le parc de D'Agnas ; Dernier échantillonnage au 14/09/2026.
- **Mytilobs** : Observatoire des mortalités de moules d'Ifremer. Dernier échantillonnage au 14/09/2026.

Mortalités des huîtres :

⇨ En Charente-Maritime

Mortalité cumulée moyenne en %	OBS-17	SUZON-17				ECOSCOPA
	Lots naturels charentais	Lots naturels arcachonnais	Lots naturels charentais	Lots d'écloserie 2N	Lots d'écloserie 3N	Naissains NSI
An 1 (naissains)	30,4	55,0	60,5	20,7	47,5	40,2
An 2 (18 mois)	11,2	10,7	27,2	19,5	20,7	3,1
An 3 (30 mois)	11,5	12,5	13,1	13,6	5,8	6

Rq : Mortalité Observatoire-17 sur les 2 parcs en commun pour l'OBS et SUZON : 35,8% (An1), 9,2% (An2) et 14,4% (An3).

⇨ Dans les autres bassins :

Observatoire ostréicole et SUZON du Bassin d'Arcachon – CAPENA :

Mortalité cumulée moyenne en %	OBS-33	SUZON-33				ECOSCOPA
	Lots naturels arcachonnais	Lots naturels arcachonnais	Lots naturels charentais	Lots d'écloserie 2N	Lots d'écloserie 3N	Naissains NSI
An 1 (naissains)	75,3	73,9	75,4	71,0	62,5	40,2
An 2 (18 mois)	35,2	38,3	32,3	33,4	32,4	4,0
An 3 (30 mois)	16,5	23,6	25,0	23,1	22,2	2,9

Rq : Mortalité Observatoire-33 sur les 3 parcs commun pour l'OBS et SUZON : 70,7% (An1), 31% (An2) et 19% (An3).

ECOSCOPA - NSI :Echantillonnages du 28/08/2026 au 28/09/2026			
% Mortalités cumulées	**An1**	**An2**	**An3**
Baie des Veys (10/09)	29,1	14,3	0,7
Cancale (09/09)	27,1	4,4	2
Rade de Brest (14/09)	38,1	15,5	2,3
Penerf (10/09)	30,7	12,3	2,3
Baie de Bourgneuf (28/09)	42,7	20,3	5
Thau (25/08/26)	15,5	8,4	1,3

Les mortalités de naissains d'huitres apparues mi-mai sur les deux bassins ostréicoles de Nouvelle-Aquitaine (17 et 33), ont **évolué différemment sur les deux secteurs**.

En Charente-Maritime, la mortalité de naissains naturels est passée de 22,4% à 30,4% durant l'été, dans le cadre du suivi de l'observatoire, valeur inférieure à celle de 2025 à la même période (55,3%), alors que sur Arcachon, elle est passée de 49,5% à 75,3%, valeur plus élevée qu'en 2025 (63,7%).

La mortalité d'huitres naturelles de 2ème et 3ème année est faible en Charente-Maritime, respectivement 11,2% et 11,5%, mais plus élevée en Gironde, respectivement 35,2% et 16,5%.

Dans le cadre de SUZON, la mortalité de naissains naturels sur les 2 parcs charentais est plus élevée que dans le cadre de l'observatoire, pour atteindre 60,5% sur les naissains charentais. Les naissains 2N présentent la plus faible mortalité (20,7%), et les naissains 3N ont une valeur intermédiaire (47,5%).

Dans le bassin d'Arcachon, tous les types de naissain présentent une forte mortalité en 1ère année d'élevage, au-dessus de 70%, sauf les 3N avec 62,5%.

La mortalité en 2ème et 3ème année est également plus élevée dans le bassin d'Arcachon qu'en Charente-Maritime, quel que soit le type de naissain.

La température estivale de l'eau étaient systématiquement au-dessus des valeurs de référence, généralement supérieure à 22°C, avec un pic à 26,8°C fin juin sur l'ensemble des 7 sites charentais du suivi des larves, puis comprise entre 21,5 et 23,3°C en juillet et aout.

Dans le bassin d'Arcachon, cette température de l'eau est montée plus haut, avec des valeurs souvent supérieures à 25°C de juin à août (moyenne des 6 sites de suivi des larves).

La mortalité du naissain d'huitres NSI en Charente-Maritime est montée à 40,2% sur les deux bassins ostréicoles de Nouvelle-Aquitaine. Sur les autres sites français, la mortalité du naissain NSI est plus faible sauf en Baie de Bourgneuf, où elle est similaire (42,7%). La mortalité de 2ème année est variable selon les sites (3,1% à 20,3%), et en 3ème année elle est relativement faible (0,7% à 6% en septembre).

Bouquet Anne-Lise – al.bouquet@cape-na.fr
CAPENA – Expertise et Application
05 46 47 49 52 – www.cape-na.fr

Région Nouvelle-Aquitaine
La Nouvelle-Aquitaine et l'Europe agissent ensemble pour votre territoire
Comité Régional de la Conchyliculture Charente-Maritime
Ifremer
Ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation, de la Pêche, de la Ruralité et de l'Aménagement du Territoire


Flash Info Mortalités

Bulletin d'information sur les Pertuis Charentais

État sur les mortalités d'huîtres et de moules à la date du 1er octobre 2026

Autres mollusques :

⇨ Mortalités de moules :



Le suivi Mytilobs 2026 sur **Boyard** montre 20,5% de mortalité cumulée en juin et 23,5% mi-septembre, valeurs proches de celles de 2025 à la même période.

Sur l'ensemble des pertuis charentais :
Des signalements de mortalités sur des naissains de moules ont été fait par des professionnels dès le printemps.
De juin à septembre, nombreux signalements de mortalités et déclarations REPAMO réalisés, avec une plus grande intensité sur le secteur de Marsilly – Esnandes, suivi de déclaration sur les secteurs de Fouras, Aix et Baie d'Yves. Le secteur de Boyard est le moins impacté.

Les plus fortes mortalités de moules ont été signalées sur des cordes de naissains, avec des pertes estimées par les professionnels de 60 à 100%.
Des mortalités de marchandes ont aussi été déclarées, avec des pertes estimées comprises entre 30 et 50%.

Les professionnels ont constaté une fragilité de la fixation du byssus.

⇨ Mortalités de Palourdes en claires :

De nombreux professionnels constatent une très forte mortalité de palourdes élevées en claires, aussi bien sur des palourdes de demi-élevage que sur des palourdes marchandes.
En cet fin d'été, 4 déclarations REPAMO ont été réalisées (15% de mortalité sur des palourdes de demi-élevage et 60 à 100% de mortalité sur des palourdes marchandes).

Dans le cadre du suivi sanitaire des claires pour les élevage de bivalves fouisseurs, le service qualité du CRC 17 suit des lots de palourdes en claires. Il a été constaté 100% de mortalité sur plusieurs lots successifs de juin à aout, quel que soit l'origine des palourdes mises en claires.

Le mot du CRC et de la DDTM

⇨ **Mortalité de palourdes** : le CRC invite tous les professionnels à faire remonter leurs constats.

⇨ **Rappel : En cas de constat de mortalité anormale** : les déclarations officielles sont à réaliser via le site www.repamo.fr

Pour toutes informations complémentaires vous pouvez vous adresser à vos référents CRC régionaux (Félix ANSART 06.70.53.46.25 / Aliénor PRIVAT 06.83.19.65.22).

Bouquet Anne-Lise – al.bouquet@cape-na.fr
CAPENA – Expertise et Application
05 46 47 49 52 – www.cape-na.fr

Région Nouvelle-Aquitaine
La Nouvelle-Aquitaine et l'Europe agissent ensemble pour votre territoire
Comité Régional de la Conchyliculture Charente-Maritime
Ifremer
Ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation, de la Pêche, de la Ruralité et de l'Aménagement du Territoire