

## Bulletin d'information sur le Bassin d'Arcachon

### État des mortalités d'huîtres creuses à la date du 29 septembre 2026

Le Flash Info Mortalités « FIM » présente aux ostréiculteurs une actualité sur les mortalités 2026. Les faits et connaissances communiqués sont validés par l'ensemble des partenaires : CAPENA, CRCAA, Ifremer et DDTM.

Les résultats ci-dessous présentent les constats des mortalités d'huître creuse à l'issue de l'été 2026. Les données sont issues des divers réseaux d'observations de CAPENA et de ses partenaires :

- **Observatoire ostréicole du Bassin d'Arcachon** mis en place par CAPENA : naissains naturels arcachonnais sur 6 parcs de référence (*FIM n°0*). Dernier échantillonnage au 29/09/2026. Les résultats sont disponibles sur le bulletin saisonnier : [ICI](#).
- **Suivi comparatif du statut ZOosanitaire et des performances productives des Naissains d'huîtres creuses (SUZON – suite SIPEN)** mis en place par CAPENA : 2 lots de naissains naturels (arcachonnais et charentais), 3 lots 3N et 3 lots 2N mutualisés entre les 4 centres techniques régionaux français et les CRCs Bretagne Nord et Bretagne Sud. Suivis sur 3 parcs de référence de CAPENA. Dernier échantillonnage au 29/09/2026.
- **Suivi ECOSCOPA de l'Ifremer** : naissains NSI (Naissains Standardisés Ifremer, diploïdes) sur le parc du Tés. Echantillonnage du 15/09/2026.

## Mortalités dans le Bassin d'Arcachon

| Mortalité cumulée moyenne en % | OBS - 33                   | SUZON                      |                          |                     |                     | ECOSCOPA      |
|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|                                | Lots naturels arcachonnais | Lots naturels arcachonnais | Lots naturels charentais | Lots d'écloserie 2N | Lots d'écloserie 3N | Naissains NSI |
| An 1 (naissains)               | 75,3 (± 10,6)              | 73,9 (± 12,3)              | 75,4 (± 19,5)            | 71,0 (± 14,1)       | 62,5 (± 21,9)       | 40,2          |
| An 2 (18 mois)                 | 35,2 (± 7,5)               | 38,3 (± 10,8)              | 32,3 (± 10,0)            | 33,4 (± 5,9)        | 32,4 (± 7,2)        | 4,0           |
| An 3 (30 mois)                 | 16,5 (± 7,2)               | 23,6 (± 0,4)               | 25,0 (± 5,5)             | 23,1 (± 9,0)        | 22,2 (± 4,7)        | 2,9           |

Rq : Mortalité Observatoire de 70,7% (An1), 31,0% (An2), 19,0% (An3) sur les 3 parcs en commun pour l'OBS et SUZON

Les pertes en 2<sup>ème</sup> année évoluent entre 32 % et 38 % avec les plus faibles valeurs pour les huîtres de captage naturel charentais et triploïdes. Les huîtres arcachonnaises sont les plus touchées en 2<sup>ème</sup> année d'élevage avec 38% de mortalité cumulée et les huîtres charentaises atteignent 25% de mortalité en 3<sup>ème</sup> année d'élevage.

Les mortalités cumulées sur le naissain du suivi SUZON à l'issue du printemps sont comprises entre 63% sur les lots d'huîtres triploïdes d'écloserie et 75% sur le naissain naturel charentais.

## Mortalités dans les autres bassins de production


### Observatoire national ECOSCOPA

Moyenne des mortalités cumulées par bassin de production sur les huîtres creuses mi-septembre 2026.

### Observatoire ostréicole et SIPEN en Charente Maritime – CAPENA

| Mortalité cumulée moyenne en % | OBS - 17                 | SUZON                      |                          |                     |                     |
|--------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
|                                | Lots naturels charentais | Lots naturels arcachonnais | Lots naturels charentais | Lots d'écloserie 2N | Lots d'écloserie 3N |
| An 1 (naissains)               | 30,4                     | 55,0                       | 60,5                     | 20,7                | 47,5                |
| An 2 (18 mois)                 | 11,2                     | 10,7                       | 27,2                     | 19,5                | 20,7                |
| An 3 (30 mois)                 | 11,5                     | 12,5                       | 13,1                     | 13,6                | 5,8                 |

Rq : Mortalité Observatoire de 35,8% (An1), 9,2% (An2), 14,4% (An3) sur les parcs en commun pour l'OBS et SUZON



## Le mot du CRC et de la DDTM

Vous rapportez également de fortes mortalités depuis début septembre, notamment sur les naissains d'un an. N'hésitez pas à faire vos déclarations sur [www.repamo.fr](http://www.repamo.fr) afin d'avoir des chiffres officiels.

En cas d'observation d'huîtres moribondes (besoin d'au moins 10 individus pour une analyse de *Vibrio aestuarianus* ou herpès virus), vous pouvez faire un prélèvement et contacter le GDSO.

Marion BÉCHADE – [m.bechade@cape-na.fr](mailto:m.bechade@cape-na.fr)

CAPENA – Expertise et Application

05 57 73 08 45 / 06 81 98 30 72 – <http://www.cape-na.fr>